













曬田
田間浸水
反光布





夜蛾類性費洛蒙誘引劑每公頃5-10個

(每個月更換一次誘引劑)。

黃色粘板每3公尺懸掛一張，

高度在植株上方(每個月更換一次)。





常用的殺蟲劑

有機磷類 (..... 松) 系統性 殘留期長

氨基甲酸鹽類 --- 納乃得、加保利、丁基加保扶

合成除蟲菊類 (..... 寧) 接觸性 瞬間擊昏昆蟲

昆蟲生長調節劑 (..... 隆) 緩效型

抗生素類 (密滅汀、阿巴汀)

類尼古丁態殺蟲劑 (益達胺、亞滅培)

微生物製劑 (蘇力菌) 緩效型 安全性高



時代不同了 噴藥莫草率
試著瞭解藥劑效果的地域性差異

害蟲抗藥性的產生

濃度過高或不足 (殺不死我 你就慘!)

用藥次數太密集 (再噴 就不死給你看!)

迷信特定藥劑 (人參一定強過蘿蔔乾!)

過度混合用藥 (什錦麵吃多了! 後患無窮)

解決抗藥性的方法

不同類型的藥劑輪替使用(孫悟空72變)

選擇合法藥劑(摸蜆兼洗褲)

遵守施用濃度(守信的人最有福)

A scenic photograph of a calm lake. A tree with green leaves stands on the right bank, its reflection clearly visible in the water. A small boat is docked near the tree. The background shows a hazy, green landscape.

台中場 植物保護研究室
TEL：04-8523101轉321
04-8521493
E-mail：paikf@tdais.gov.tw