


本旬四種蔬果害蟲發生概況


東方果實蠅

高密度地區：1.阿蓮（高）2.社頭（彰）3.高樹（屏）
平均密度：49.4 未回報：12 站




瓜實蠅

高密度地區：1.七股（南）2.萬丹（屏）3.大社（高）
旬平均密度：11.7 未回報：1 站




斜紋夜蛾

高密度地區：1.蘆洲（北）2.褒忠（雲）3.大城（彰）
旬平均密度：20.8 未回報：1 站



甜菜夜蛾

高密度地區：1.褒忠（雲）2.大城（彰）3.大甲（中）
平均密度：5.3 未回報：1 站



工作重點

防治措施

(1) 果實蠅：

本期彰化及高雄番石榴產區果實蠅族群明顯高於其它地區，仍有造成大量流行之風險。另雲林縣甜橙產區果實蠅族群密度逐漸升高，可能會影響甜橙生產，應加入食物誘餌的撲殺。整體而言，目前全島果實蠅族群危害壓力已減緩，柑類被害風險較高，請各地柑橘產區應加強果實蠅防治。本所建議：(1)果樹專業區農友，實施共同防治外，個別管理務必做好食物誘餌撲殺成蟲及果園區受害果清理，以杜絕新生族群增長。(2)第三批資材均已完成寄運，請指導員加強宣導農民懸掛資材，協助農民藉由族群密度監測及寄主水果產期資訊，持續進行果實蠅防治。

(2) 瓜實蠅：

本期熱源區仍為七股區(台南)、萬丹鄉(屏東)及大社區(高雄)等瓜果專業區(如分布圖)，主要產區集中於南部設施栽培區，被害風險已大為降低。本階段重點防治工作建議減少孳生源，本所建議瓜果產銷班儘早規劃於開花期就開始實施施用滅雄及食物誘餌等兩項防治技術，並於瓜園外圍植株或棲息作物如蓖麻或朱槿，加強附近食物誘餌之施用，避免瓜實蠅入侵瓜園危害。

(3) 斜紋夜蛾：

密度出現較多地區以蘆洲區(新北)、大城鄉(彰化)及褒忠鄉(雲林)為主，較去年同期密度維持一致，受到氣候及寄主作物影響，本期族群密度呈穩定發展，目前熱源區集中於西部雲嘉南雜糧特作區，尤其是花生及甘薯。本所建議雜作專業區及甘薯栽植區規劃使用性費洛蒙防治及配合疫情，參考植保手冊等推薦農藥，輪用不同類藥劑方式進行幼蟲防除，減低抗藥性產生。

(4) 甜菜夜蛾：

熱源區為褒忠鄉(雲林)、大城鄉(彰化)及大甲區(台中)，甜菜夜蛾密度低而穩定，惟須注意高風險地區如三星地區及台中大甲青蔥專業區之防治工作。

各地區害蟲密度監測執行檢討

◆ 有關密度監測執行說明如下：

(一)、一般防治區未回報密度資料者：

- (1).果實蠅：卓蘭鎮、公館鄉、三灣鄉(苗栗)、石岡區(台中)、古坑鄉(雲林)、番路鄉、竹崎鄉(嘉義)、杉林區(高雄)、鹽埔鄉(屏東)、台東地區(台東)、玉溪地區、富里鄉(花蓮)。
- (2).瓜實蠅：玉溪地區(花蓮)。
- (3).斜紋夜蛾：公館鄉(苗栗)。
- (4).甜菜夜蛾：公館鄉(苗栗)。

本旬報每月發行3次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/index.asp?Parser=3,9,56>，每旬更新一次。



瓜實蠅危害絲瓜幼果



被害果上之寄生蜂



第 121113 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(101 年 11 月 4 日至 101 年 11 月 13 日)



蔬果重要蟲害即時防疫訊息

- 一. 東方果實蠅:**本旬果實蠅平均密度為 49.4 隻，較前一旬(43.4 隻)上升 13.9%，較去年同期下降 27.0%。目前以阿蓮區(高雄)、社頭鄉(彰化)及高樹鄉(屏東)密度較高，為果實蠅平均密度之 8.9、7.0 及 2.7 倍。
- 二. 瓜實蠅:**本旬瓜實蠅平均密度為 11.7 隻，較前一旬(13.1 隻)下降 10.5%，較去年同期下降 24.5%。其中七股區(台南)、萬丹鄉(屏東)及大社區(高雄)較高，為瓜實蠅平均密度之 3.3、3.0 及 1.8 倍。
- 三. 斜紋夜蛾:**本旬斜紋夜蛾平均密度為 20.8 隻，較上一旬(21.4 隻)下降 3.0%，較去年同期下降 10.7%。其中蘆洲區(新北)、褒忠鄉(雲林)及大城鄉(彰化)較高，為斜紋夜蛾平均密度之 3.5、3.2 及 2.4 倍。
- 四. 甜菜夜蛾:**本旬甜菜夜蛾平均密度為 5.3 隻，屬低密度，其中以褒忠鄉(雲林)、大城鄉(彰化)及大甲區(台中)等地區較高，為平均密度之 8.3、1.5 及 1.5 倍。



行政院農業委員會農業試驗所
應用動物組 農藥研究室
41301 台中市霧峰區中正路 189 號
TEL : 04-23309098 FAX : 04-23309097

印刷品