


本旬四種蔬果害蟲發生概況


東方果實蠅

高密度地區：1.官田(南) 2.斗六(雲) 3.佳冬(屏)
平均密度：179.2 未回報：10 站




瓜實蠅

高密度地區：1.七股(南) 2.萬丹(屏) 3.大社(高)
旬平均密度：15.9 未回報：3 站




斜紋夜蛾

高密度地區：1.蘆洲(北) 2.大城(彰) 3.新秀(花)
旬平均密度：20.6 未回報：2 站



甜菜夜蛾

高密度地區：1.大城(彰) 2.褒忠(雲) 3.三星(宜)
平均密度：2.8 未回報：2 站



工作重點

防治措施

(1) 果實蠅：

全島果實蠅族群受到氣候上升之影響，熱點由屏東縣佳冬、高雄、台南等果樹產區(分布圖起伏之地區)已擴大至雲林斗六。第二批共同防治資材均已寄運完畢，請各地區農會指導員，宣導產銷班農民強化防治。由全島果實蠅密度穩定增長趨勢來看，應加強受害果之清理及使用食物誘餌撲殺成蟲，避免果實蠅族群之再孳生。未來族群發展動態仍需各單位持續監控，建議其他個別管理果園務必做好食物誘餌撲殺成蟲，以杜絕新生族群增長。

(2) 瓜實蠅：

本期瓜實蠅密度與去年同期一致，以七股區(台南)及萬丹區(屏東)等瓜果栽培區較高(如分布圖)，由於全島瓜果類如苦瓜、洋香瓜、絲瓜及南瓜二期作均已進入盛產期，仍具危害風險。本所建議瓜果產銷班，實施滅雄及食物誘餌等兩項防治技術，並於瓜園外圍植株或棲息作物如蓖麻或朱槿，加強附近食物誘餌之施用，避免瓜實蠅入侵瓜園危害。

(3) 斜紋夜蛾：

本旬熱點出現在北部蘆洲區(新北市)、大城鄉(彰化)及新秀地區(花蓮)，仍以雜糧作物為主要危害區，受到氣候及寄主作物影響，整體族群發展趨勢穩定發展，未來須加強監控。本所建議甘薯等雜糧作物栽植區規劃使用性費洛蒙防治及施用推薦農藥，防除幼蟲。

(4) 甜菜夜蛾：

主要以大城鄉(彰化)及褒忠鄉(雲林)較高，甜菜夜蛾密度低而穩定，高風險地區如大甲，宜蘭縣三星地區之青蔥及其他花卉專業區之防治工作。

各地區害蟲密度監測執行檢討

◆ 有關密度監測執行說明如下：

(一)、一般防治區未回報密度資料者：

- (1).果實蠅：芎林鄉(新竹)、公館鄉(苗栗)、石岡區(台中)、溪州鄉(彰化)、古坑鄉(雲林)、東山區(台南)、長治鄉、鹽埔鄉(屏東)、玉溪地區、富里鄉(花蓮)。
- (2).瓜實蠅：壯圍鄉(宜蘭)、東山區(台南)、玉溪地區(花蓮)。
- (3).斜紋夜蛾：八德市(桃園)、公館鄉(苗栗)。
- (4).甜菜夜蛾：八德市(桃園)、公館鄉(苗栗)。

本旬報每月發行3次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/index.asp?Parser=3,9,56>，每旬更新一次。



果實蠅為害採收後期之龍眼



果實蠅為害李



第 130803 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(102 年 7 月 24 日至 102 年 8 月 3 日)



蔬果重要蟲害即時防疫訊息

- 一. 東方果實蠅:**本旬果實蠅平均密度為 179.2 隻，較前一旬(163.6 隻)上升 9.5%，較去年同期上升 114.1%。目前以官田區(台南)、斗六市(雲林)及佳冬鄉(屏東)密度較高，為果實蠅平均密度之 5.9、4.3 及 4.1 倍。
- 二. 瓜實蠅:**本旬瓜實蠅平均密度為 15.9 隻，較前一旬(15.2 隻)上升 4.8%，較去年同期上升 16.9%。其中七股區(台南)、萬丹鄉(屏東)及大社區(高雄)較高，為瓜實蠅平均密度之 2.1、1.7 及 1.6 倍。
- 三. 斜紋夜蛾:**本旬斜紋夜蛾平均密度為 20.6 隻，較上一旬(13.4 隻)上升 53.7%，與去年同期上升 4.0%。其中蘆洲區(新北)、大城鄉(彰化)及新秀地區(花蓮)較高，為斜紋夜蛾平均密度之 3.7、2.0 及 2.0 倍。
- 四. 甜菜夜蛾:**本旬甜菜夜蛾平均密度為 2.8 隻，屬低密度，其中以大城鄉(彰化)、褒忠鄉(雲林)及三星地區(宜蘭)等地區較高，為平均密度之 2.8、1.8 及 1.5 倍。



行政院農業委員會農業試驗所
應用動物組 農藥研究室
41301 台中市霧峰區中正路 189 號
TEL : 04-23309098 FAX : 04-23309097

印刷品