


本旬四種蔬果害蟲發生概況


東方果實蠅

高密度地區：1.燕巢（高）2.阿蓮（高）3.高樹（屏）
平均密度：56.9
未回報：10 站




瓜實蠅

高密度地區：1.七股（南）2.後龍（苗）3.瑞穗（花）
平均密度：12.8
未回報：4 站




斜紋夜蛾

高密度地區：1.龍井（中）2.褒忠（雲）3.大城（彰）
旬平均密度：20.0
未回報：2 站



甜菜夜蛾

高密度地區：1.褒忠（雲）2.竹北（新）3.大城（彰）
平均密度：5.2
未回報：2 站



工作重點

防治措施

(1) 果實蠅：

全島果實蠅族群受到寄主採收後期之影響，熱點集中於燕巢區、阿蓮區(高雄)及高樹鄉(屏東)等番石榴水果產區(分布圖起伏之地區)。目前全島果實蠅族群大部分已處於密度下降期，惟受到南部地區氣溫微升，部分鄉鎮經實地調查果實蠅族群數量仍高達 500 隻以上，請各單位持續監控，建議其他個別管理果園，務必做好食物誘餌撲殺成蟲，以杜絕新生族群增長。

(2) 瓜實蠅：

本期瓜實蠅密度與去年同期一致，以七股區(台南)瓜果栽培區較高(如分布圖)，此季節請加強洋香瓜或苦瓜採收期等生產專區之瓜實蠅防治工作。本所建議實施克蠅滅雄及食物誘餌等兩項防治技術，並於瓜園外圍植株或棲息作物如蓖麻或朱槿，加強附近食物誘餌之施用，避免瓜實蠅入侵瓜園危害。

(3) 斜紋夜蛾：

本旬熱點出現在龍井區(台中)及褒忠鄉(雲林)，以雜糧、特作及花生為主要危害區，目前雜糧區如花生及地瓜栽培區，仍受到氣候及寄主作物影響，整體族群發展趨勢呈上升趨勢，請強化地區性監測防治工作，本所建議花生作物栽植區規劃使用性費洛蒙防治及施用植保手冊推薦農藥，防除幼蟲。其他如雲嘉南地區之監測，此類害蟲仍有危害風險，未來須加強監控。

(4) 甜菜夜蛾：

主要仍以褒忠鄉(雲林)較高，部分地區甜菜夜蛾密度上升至 100 隻，具有危害風險，除性費洛蒙餌劑施用外，建議依植保手冊推薦藥劑實施防治。高風險地區如台中大甲及宜蘭三星地區之青蔥等生產專業區之防治工作，應持續強化。


各地區害蟲密度監測執行檢討

◆ 有關密度監測執行說明如下：

(一)、一般防治區未回報密度資料者：

- (1).果實蠅：頭城鎮(宜蘭)、新埔鎮(新竹)、公館鄉(苗栗)、石岡區(台中)、溪州鄉(彰化)、斗六市(雲林)、義竹鄉(嘉義)、鹽埔鄉(屏東)、台東地區(台東)、玉溪地區(花蓮)。
- (2).瓜實蠅：壯圍鄉(宜蘭)、義竹鄉(嘉義)、萬丹鄉(屏東)、玉溪地區(花蓮)。
- (3).斜紋夜蛾：八德市(桃園)、公館鄉(苗栗)。
- (4).甜菜夜蛾：八德市(桃園)、公館鄉(苗栗)。

本旬報每月發行3次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/>，每旬更新一次。



瓜實蠅危害苦瓜



瓜實蠅危害絲瓜



第 141203 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(103 年 11 月 24 日至 103 年 12 月 3 日)



蔬果重要蟲害即時防疫訊息

- 一. 東方果實蠅：**本旬果實蠅平均密度為 56.9 隻，較前一旬(64.5 隻)下降 11.8%，較去年同期上升 59.4%。目前以燕巢區、阿蓮區(高雄)及高樹鄉(屏東)密度較高，為果實蠅平均密度之 9.8、6.8 及 2.5 倍。
- 二. 瓜實蠅：**本旬瓜實蠅平均密度為 12.8，較前一旬(12.5 隻)上升 2.2%，較去年同期上升 9.4%。其中七股區(台南)、後龍鎮(苗栗)及瑞穗鄉(花蓮)較高，為瓜實蠅平均密度之 2.1、1.4 及 1.1 倍。
- 三. 斜紋夜蛾：**本旬斜紋夜蛾平均密度為 20.0 隻，較上一旬(29.3 隻)下降 31.8%，與去年同期下降 14.5%。其中龍井區(台中)、褒忠鄉(雲林)及大城鄉(彰化)較高，為斜紋夜蛾平均密度之 2.4、1.4 及 0.8 倍。
- 四. 甜菜夜蛾：**本旬甜菜夜蛾平均密度為 5.2 隻，屬低密度，其中以褒忠鄉(雲林)、竹北市(新竹)及大城鄉(彰化)等地區較高，為平均密度之 2.5、0.6 及 0.5 倍。



行政院農業委員會農業試驗所
應用動物組 農藥研究室
41301 台中市霧峰區中正路 189 號
TEL : 04-23309098 FAX : 04-23309097

印
刷
品