


本旬四種蔬果害蟲發生概況


東方果實蠅

高密度地區：1.枋寮（屏）2.中寮（投）3.阿蓮（高）
平均密度：41.3 未回報：10 站




瓜實蠅

高密度地區：1.佳里（南）2.七股（南）3.東山（南）
平均密度：30.8 未回報：2 站




斜紋夜蛾

高密度地區：1.褒忠（雲）2.大城（彰）3.後龍（苗）
旬平均密度：10.3 未回報：0 站



甜菜夜蛾

高密度地區：1.褒忠（雲）2.後龍（苗）3.田尾（彰）
均密度：3.5 未回報：0 站



工作重點

防治措施

- (1)果實蠅：本期果實蠅族群熱點集中於枋寮地區(屏東)、中寮鄉(南投)及田寮鄉(高雄)水果產區(分布圖起伏之地區)，果實蠅族群變化略為上升，與去年同期密度變化略高。本所建議農民配合共同防治工作，持續懸掛含毒甲基丁香油誘餌之滅雄技術，壓制果實蠅族群發展，並強化食物誘餌如植保手冊推薦藥劑賜諾殺濃餌劑之點噴作業，減低雌蟲危害果實。
- (2)瓜實蠅：目前仍以佳里區及七股區(台南)之甜瓜栽培區較高(如分布圖)，全島目前平均密度已呈上升趨勢，未來須注意絲瓜及苦瓜等瓜果類作物，務必加強瓜實蠅防治工作，建議採取(1)含克蠅之滅雄防治(2)食物誘餌之撲殺成蟲(3)減少孳生源，整合性管理壓制瓜實蠅為害。
- (3)斜紋夜蛾：本旬熱點出現仍以褒忠鄉(雲林)及大城鄉(彰化)，以芋頭、花生及其他雜作為主要危害區。因大部分作物已進入生育期，蛾類幼蟲有可能持續擴散危害其他作物如紅龍果，目前族群變動呈不穩定增長，請持續進行監測工作及幼蟲藥劑防治。
- (4)甜菜夜蛾：本期仍以褒忠鄉(雲林)及後龍鎮(苗栗)較高，此蛾類常危害青蔥及其他雜糧作物，對此蛾類之防治工作應持續強化，尤其幼蟲期藥劑防治及成蟲期誘殺均應同步進行。

各地區害蟲密度監測執行檢討

◆ 有關密度監測執行說明如下：

(一)、一般防治區未回報密度資料者：

- (1).果實蠅：頭城鎮(宜蘭)、龍潭鄉(桃園)、三灣鄉(苗栗)、石岡區(台中)、溪州鄉(彰化)、中埔鄉(嘉義)、長治鄉、鹽埔鄉(屏東)、玉溪地區、富里鄉(花蓮)。
- (2).瓜實蠅：壯圍鄉(宜蘭)、玉溪地區(花蓮)。

本旬報每月發行3次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/>，每旬更新一次。



果實蠅危害果實



苦瓜受到瓜實蠅為害狀



第 170413 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(106 年 4 月 4 日至 106 年 4 月 13 日)



蔬果重要蟲害即時防疫訊息

- 一. **東方果實蠅**: 本旬果實蠅平均密度為 41.3 隻，較前一旬(35.1 隻)上升 17.6%，較去年同期上升 36.0%。其中以枋寮地區(屏東)、中寮鄉(南投)及阿蓮區(高雄)密度較高，為果實蠅平均密度之 9.8、5.5 及 3.1 倍。
- 二. **瓜實蠅**: 本旬瓜實蠅平均密度為 30.8 隻，較前一旬(23.0 隻)上升 34.0%，較去年同期上升 34.0%。其中佳里區、七股區及東山區(台南)較高，為瓜實蠅平均密度之 8.1、3.5 及 1.0 倍。
- 三. **斜紋夜蛾**: 本旬斜紋夜蛾平均密度為 10.3 隻，較上一旬(9.2 隻)上升 11.6%，較去年同期下降 11.2%。其中褒忠鄉(雲林)、大城鄉(彰化)及後龍鎮(苗栗)較高，為斜紋夜蛾平均密度之 4.3、2.6 及 2.0 倍。
- 四. **甜菜夜蛾**: 本旬甜菜夜蛾平均密度為 3.5 隻，屬低密度，其中以褒忠鄉(雲林)、後龍鎮(苗栗)及田尾鄉(彰化)等地區較高，為平均密度之 5.3、2.4 及 1.2 倍。



行政院農業委員會農業試驗所
應用動物組 農藥研究室
41301 台中市霧峰區中正路 189 號
TEL : 04-23309098 FAX : 04-23309097

印刷品