

工作重點

防治措施

- (1) **果實蠅**：本期果實蠅族群熱點以阿蓮區(高雄)水果產區(分布圖起伏之地區)，此地區因番石榴及印度棗採收後期導致果實蠅族群密度升高且居全島高峰，有逐漸增高之趨勢。本所建議這些地區農民配合防檢局誘殺資材之配發，持續懸掛含毒甲基丁香油誘餌之滅雄技術，壓制果實蠅族群發展，並強化食物誘餌如植保手冊推薦藥劑賜諾殺濃餌劑之點噴作業，減低雌蟲危害果實。
- (2) **瓜實蠅**：本期以大社區(高雄)及佳里區(台南)之苦瓜及甜瓜栽培區較高(如分布圖)，全島目前平均密度呈穩定變化，較去年同期一致，未來仍須注意甜瓜及苦瓜等瓜果類作物採收後期之族群孳生，務必加強瓜實蠅防治工作，建議採取(1)含克蠅之滅雄防治(2)食物誘餌之撲殺成蟲(3)減少孳生源，整合性管理壓制瓜實蠅為害。
- (3) **斜紋夜蛾**：本旬熱點出現後龍鎮(苗栗)，以雜作為主要危害區。目前族群變動呈不穩定狀態，請持續進行監測工作及幼蟲藥劑防治，若在田間看到卵塊，可直接摘除，減少孳生源。
- (4) **甜菜夜蛾**：本期仍以褒忠鄉(雲林)較高，此蛾類常危害青蔥及其他雜糧作物，針對此蛾類之防治工作應持續強化，尤其幼蟲期藥劑防治及成蟲期誘殺均應同步進行。

各地區害蟲密度監測執行檢討

◆ 有關密度監測執行說明如下：

(一)、一般防治區未回報密度資料者：

- (1). 果實蠅：公館鄉(苗栗)、溪州鄉(彰化)、玉溪地區(花蓮)。
- (2). 瓜實蠅：玉溪地區(花蓮)。
- (3). 斜紋夜蛾：三星地區(宜蘭)、公館鄉(苗栗)。
- (4). 甜菜夜蛾：三星地區(宜蘭)、公館鄉(苗栗)。

本旬報每月發行3次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/>，每旬更新一次。



瓜實蠅危害絲瓜



果實蠅停留於枇杷果實




第 180303 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(107 年 2 月 24 日至 107 年 3 月 3 日)



蔬果重要蟲害即時防疫訊息

- 一. **東方果實蠅**: 本旬果實蠅平均密度為 34.3 隻，較前一旬(43.4 隻)下降 21.0%，較去年同期上升 43.5%。其中以**阿蓮區(高雄)**、**中寮鄉(南投)**及**台東地區(台東)**密度較高，為果實蠅平均密度之 11.8、2.7 及 2.3 倍。
- 二. **瓜實蠅**: 本旬瓜實蠅平均密度為 9.0 隻，較前一旬(7.0 隻)上升 28.1%，與去年同期下降 6.2%。其中**大社區(高雄)**、**佳里區(台南)**及**萬丹鄉(屏東)**較高，為瓜實蠅平均密度之 3.0、2.9 及 2.4 倍。
- 三. **斜紋夜蛾**: 本旬斜紋夜蛾平均密度為 7.0 隻，較上一旬(6.9 隻)上升 1.8%，較去年同期下降 21.3%。其中**後龍鎮(苗栗)**、**新秀地區(花蓮)**及**田尾鄉(彰化)**較高，為斜紋夜蛾平均密度之 2.9、1.8 及 1.7 倍。
- 四. **甜菜夜蛾**: 本旬甜菜夜蛾平均密度為 1.0 隻，屬低密度，其中以**褒忠鄉(雲林)**、**田尾鄉(彰化)**及**竹北市(新竹)**等地區較高，為平均密度之 3.6、2.4 及 1.2 倍。



行政院農業委員會農業試驗所
應用動物組 農藥研究室
41301 台中市霧峰區中正路 189 號
TEL: 04-23309098 FAX: 04-23309097

印刷品