


本旬四種蔬果害蟲發生概況


東方果實蠅

高密度地區：1.大樹(高) 2. 六龜(高) 3. 枋山(屏)
平均密度：435.9 未回報：2 站




瓜實蠅

高密度地區：1.大社(高) 2. 玉溪(花) 3. 壯圍(宜)
平均密度：16.4 未回報：0 站




斜紋夜蛾

高密度地區：1.壯圍(宜) 2. 新社(中) 3. 三星(宜)
平均密度：34.2 未回報：1 站



甜菜夜蛾

密度地區：1.壯圍(宜) 2. 三星(宜) 3.後龍(苗)
平均密度：25.4 未回報：1 站



防治措施

- (1) **果實蠅**：本期果實蠅族群熱點為大樹、六龜(高雄)、枋山及枋寮(屏東)等水果產區(分布圖起伏之地區)與去年同期高 1.1 倍，另水里及中寮(南投)族群也已進入穩定增加期。由圖顯示，由於季節水果樹上殘餘果如芒果、荔枝、蓮霧及番石榴均缺乏後續管理，導致果實蠅族群密度增高，全島族群密度隨溫度影響已進入穩定增長期。因應新生族群將會向外分散危害，族群分散由南逐漸往北，請產銷班協助宣導，持續懸掛含毒甲基丁香油誘餌之滅雄技術，壓制果實蠅族群發展，並強化食物誘餌如推薦藥劑賜諾殺濃餌劑之點噴作業，減低雌蟲危害果實。
- (2) **瓜實蠅**：本期目前仍以大社(高雄)及玉溪(花蓮)之甜瓜或絲瓜栽培區較高(分布圖)，目前平均密度較去年同期略高，須注意苦瓜及絲瓜等瓜果作物採收後期之族群孳生，務必加強瓜實蠅防治工作，建議採取(1)含克蠅之滅雄防治(2)食物誘餌之撲殺成蟲(3)減少孳生，整合性管理壓制瓜實蠅為害。
- (3) **斜紋夜蛾**：本旬熱點出現為壯圍(宜蘭)，族群變動較去年同期增加，族群增長趨於穩定，務必注意幼蟲危害，請持續進行田間幼蟲監控或卵塊，若在田間看到卵塊，可直接摘除，減少孳生源。
- (4) **甜菜夜蛾**：本期以壯圍及三星(宜蘭)較高，族群發展趨於穩定增加，需持續監控，由於此蛾類常危害青蔥及其他雜糧作物如花生，針對此蛾類之防治工作應持續強化，尤其幼蟲藥劑防治及成蟲期誘殺均應同步進行。

各地區害蟲密度監測執行檢討

◆ 有關密度監測執行說明如下：


(一)、一般防治區未回報密度資料者：

1. 果實蠅：頭城鎮(宜蘭)、金門縣。

本旬報每月發行 3 次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/>，每旬更新一次。



甜菜夜蛾為害青蔥



果實蠅為害橫山梨



第 210623 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(110 年 06 月 14 日至 110 年 06 月 23 日)



蔬果重要蟲害即時防疫訊息

- 一. **東方果實蠅**：本旬果實蠅平均密度 435.9 隻，較前一旬 297.6(隻)上升 46.5%，較去年同期上升 153.0%。其中大樹區、六龜區(高雄)及枋山地區(屏東)較高，為果實蠅平均密度之 12.4、8.4 及 7.6 倍。
- 二. **瓜實蠅**：本旬瓜實蠅平均密度為 16.4 隻，較前一旬(13.7 隻)上升 19.8%，較去年同期上升 10.2%。其中大社區(高雄)、玉溪地區(花蓮)及壯圍鄉(宜蘭)較高，為瓜實蠅平均密度之 3.7、3.4 及 2.8 倍。
- 三. **斜紋夜蛾**：本旬斜紋夜蛾平均密度為 34.2 隻，較上一旬(9.9 隻)上升 245.7%，較去年同期上升 113.9%。其中壯圍鄉(宜蘭)、新社區(台中)及三星地區(宜蘭)較高，為斜紋夜蛾平均密度之 9.5、0.9 及 0.8 倍。
- 四. **甜菜夜蛾**：本旬甜菜夜蛾平均密度為 25.4 隻，屬低密度，其中以壯圍鄉(宜蘭)、三星地區(宜蘭)及後龍鎮(苗栗)等地區較高，為平均密度之 7.8、1.4 及 0.4 倍。



行政院農業委員會農業試驗所
應用動物組 農藥研究室
413001 台中市霧峰區中正路 189 號
TEL：04-23317632 FAX：04-23309097
害蟲監測 pestmonitor@tari.gov.tw

印刷品

《郵地區號》

《地址》

《單位》

《收件者》《稱謂》收