




本資訊係依據農委會動植物防疫檢疫局委辦「強化植物有害生物防範措施(104 救助調整-檢-01)」計畫執行
由防檢局及農業試驗所聯合製作，彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、台南市政府及彰雲嘉南地區 57 個鄉鎮市區農會協助辦理

2015 年 7 月 13 日彰雲嘉南地區夜蛾類害蟲密度監測旬報

1. 監測資料應回報 57 處，實際回報 57 處，回報率 100%。
2. 本期斜紋夜蛾類平均密度下降 1.4%，甜菜夜蛾密度降低 47.7%，番茄夜蛾下降 49%。




本期斜紋夜蛾監測密度以彰化縣福興鄉較高，甜菜夜蛾高密度地區與斜紋夜蛾發生區域類似；番茄夜蛾則在嘉義縣朴子市及鹿草鄉發生密度稍高，請指導員持續監測密度消長趨勢及田間危害狀況。

上期番茄夜蛾監測密度上升經查詢係監測區域鄰近地區作物已屆採收後期，本期誘捕數量已降低。


作物收穫後害蟲族群可能遷移至鄰近的雜草或缺乏管理的田區，俟下一期作種植後，再遷回危害，為避免作物受害，加強田間管理並防除雜草，可減少種植初期蟲害發生機會，減輕管理壓力。

2015 年 7 月 13 日彰雲嘉南地區三種夜蛾密度監測旬報


本旬資料：
7月4日 - 7月13日



旬密度平均值：15.8 隻
最高值：91.3 隻（福興鄉）
高於平均值鄉鎮數：21



旬密度平均值：90.6 隻
最高值：358.3 隻（新化區）
高於平均值鄉鎮數：19



旬密度平均值：5 隻
最高值：30.5 隻（鹿草鄉）
高於平均值鄉鎮數：18