


# 本旬瓜果實蠅發生概況


## 東方果實蠅

高密度地區：1.玉井(南) 2.燕巢(高) 3.六龜(高)  
平均密度：312.6：2站



## 瓜實蠅


高密度地區：1.大社(高) 2.東山(南) 3.玉溪(花)  
平均密度：13.2：0站



澎湖縣果實蠅密度監測圖  
20220903

警示燈號密度範圍


- 0~64 綠燈
- 65~256 藍燈
- 257~1024 黃燈
- ~1025 紅燈



澎湖縣瓜實蠅密度監測圖  
20220903

警示燈號密度範圍

- 0~64 綠燈
- 65~256 藍燈
- 257~1024 黃燈
- ~1025 紅燈



## 防治措施

- (1) **果實蠅**：本期果實蠅族群熱點為玉井(台南)、燕巢(高雄)及六龜(高雄)等水果產區(分布圖起伏之地區)與去年同期高約2倍。由圖顯示，由於季節水果樹上殘餘果如芒果及番石榴屬於採收後缺乏後續管理，導致果實蠅族群密度增高，全島族群密度隨溫度影響已進入穩定增長期。因應新生族群將會向外分散危害，請產銷班協助宣導，持續懸掛甲基丁香油誘餌之滅雄技術，壓制果實蠅族群發展，並強化食物誘餌如推薦藥劑賜諾殺濃餌劑之點噴作業，減低雌蟲危害果實。
- (2) **瓜實蠅**：本期目前仍以大社(高雄)之絲瓜或甜瓜栽培區較高(分布圖)，目前平均密度較去年同期下降13.4%，須注意苦瓜及絲瓜等瓜果作物採收後期之族群孳生，務必加強瓜實蠅防治工作，建議採取(1)含克蠅之滅雄防治(2)食物誘餌之撲殺成蟲(3)減少孳生，整合性管理壓制瓜實蠅為害。



果實蠅為害番石榴



瓜實蠅為害絲瓜

◆ 有關密度監測執行說明如下：

(一) 一般防治區未回報密度資料者  
**各地區害蟲密度監測執行檢討**

1. 果實蠅：頭城鎮(宜蘭)、寶山鄉(新竹)。

本旬報每月發行 3 次，提供農政單位、試驗機構及產銷班掌握害蟲資訊，若需索取書面原始密度資料請另洽。為方便相關單位掌握此項訊息，另建置專屬網頁，供各界下載瀏覽，網址為 <http://www.tari.gov.tw/form/>，每旬更新一次。



# 第 220903 號蔬果重要害蟲防疫旬報

(111 年 08 月 24 日至 111 年 09 月 03 日)



## 重要蟲害即時防疫訊息



**東方果實蠅**：本旬果實蠅平均密度 312.6 隻，較前一旬(290.7 隻)上升 7.5%，較去年同期上升 180.4%。其中玉井區(台南)、燕巢區(高雄)及六龜區(高雄)較高，為果實蠅平均密度之 15.8、8.9 及 8.2 倍。



**瓜實蠅**：本旬瓜實蠅平均密度為 13.2 隻，較前一旬(20.3 隻)下降 35.2%，較去年同期下降 13.4%。其中大社區(高雄)、東山區(台南)及玉溪地區(花蓮)較高，為瓜實蠅平均密度之 2.1、2.0 及 1.3 倍。

行政院農業委員會農業試驗所  
應用動物組 害蟲生理生化研究室  
413001 台中市霧峰區中正路 189 號  
TEL : 04-23317632 FAX : 04-23309097  
害蟲監測 pestmonitor@tari.gov.tw

印刷品

《郵地區號》

《地址》

《單位》

《收件者》《稱謂》收