

豇豆種原圖說

Vigna unguiculata (L.) Walp. Germplasm Illustrations



行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號

電話：(04)2330-2301 傳真：(04)2333-8162

ISBN : 978-986-04-7744-3



GPN : 101403459

農業試驗所特刊190號

豇豆種原圖說

行政院農業委員會農業試驗所



豇豆種原圖說

Vigna unguiculata (L.) Walp. Germplasm Illustrations



序

豇豆 [*Vigna unguiculata* (L.) Walp.] 為豆科(Fabaceae/Leguminosae)豇豆屬(*Vigna*)一年生蔓性草本植物，目前所有的栽培種均隸屬於亞種 *ssp. unguiculata*。栽培種豇豆通常可再細分為四群(group)：1. *Biflora (cylindrical)* Group—短豇豆、2. *Sesquipedalis* Group—長豇豆、3. *Unguiculata* Group—黑眼豆及4. *Textilis* Group，其中長豇豆 (*V. unguiculata* ssp. *unguiculata* Sesquipedalis Group) 耐熱、耐濕、營養價值高，主要以嫩莢供食，除作鮮菜外，亦適於製作豆漿干或冷凍加工，是臺灣重要夏季蔬菜之一，盛產期在4~9月，通常可分為有青皮、白皮、紅皮及花皮等四種系統，以青皮與白皮系統栽培較為普遍。依據台灣農業統計年報，100~103年平均產量達1,1079.8公噸，主要產區為屏東縣、高雄市、雲林縣及彰化縣，其中以屏東縣產量最高。

本所作物種原組自95年起即系統化保存豇豆種原，然或因種子粒數不足，或因發芽率下降，這些材料仍保存於中期庫，無法進入長期庫進行長期保存。為避免珍貴種原得而復失，加速中期庫種原繁殖活化速度，本年度本所爭取競爭型計畫「活化國家作物種原庫保存之重要農糧作物種子種原」(104農科-9.7.6-農-C1)，透過計畫經費的支援及支持，結合各區改良場所專家的協助，進行豇豆等2,000份種原材料的繁殖、性狀調查與影像資料的建檔工作，大幅度地增進國內種原材料的更新繁殖與利用的效果。

本書以一個種原暫時碼材料為一個單位，配合株型、莢長、莢寬、莢厚、嫩莢肉質、嫩莢肉厚、每莢種仁數等各項園藝性狀，佐以植株、花及豆莢等影像，呈現其種原特性。希望這些珍貴資料能讓讀者明瞭豇豆種原的多樣性，並提育種人員進行品種改良之參考。

農業試驗所 所長

中華民國104年12月

前言

豇豆屬 (*Vigna*)為豆科一年生草本或矮灌木植物，與菜豆屬 (*Phaseolus*) 極相似，主要差異在於花粉粒結構(pollen structure)及花柱與托葉的細微。羽狀複葉，三出葉；總狀花序，花色有黃色、藍色及紫色；豆莢形態迥異大，內含種子。豇豆屬是紀念十七世紀義大利植物學家、比薩植物園 (Orto botanico di Pisa) 園長 Domenico Vigna 而命名的。

本屬約有90個種(species)，下分 *Ceratotropis*(Asian Vigna)、*Haydonia*、*Lasiopsis*、*Plectrotropis*(Eurasian Vigna)及 *Vigna*(African Vigna) 等五個亞屬。*Ceratotropis*亞屬的綠豆(Mung bean)[*V. radiate* (L.) Wilczek]、黑豆(Black gram) [*V. mungo* (L.) Hepper] 及烏頭葉豇豆(Moth bean) [*V. aconitifolia* (Jacq.) Maréchal] 在印度栽培化；米豆(Rice bean) [*V. umbellata* (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi] 及克里奧爾豆(creole bean) [*V. reflexopilosa* var. *glabra* Tomooka & Maxted] 在東南亞地區栽培化；紅豆(Adzuki bean) [*V. angularis* (Willd.) Ohwi & H. Ohashi] 可能是在東亞地區的日本栽培化；而豇豆(Cowpea) [*V. unguiculata* (L.) Walp.] 與班巴拉花生(Bambara groundnut) [*V. subterranea* (L.) Verdc.] 則可能是在非洲地區的西非栽培化。

豇豆($2n=2x = 22, 24$) (*V. unguiculata*)又叫豆角、紅豆(不是赤豆)、豇豆、英文名cowpea、crowder pea、Southern pea、Reeve's-pea與snake-bean。目前所有的栽培種均隸屬於亞種ssp. *unguiculata*，其他的亞種則均為野生近緣種(wild relatives)，包含：ssp. *stenophylla* (Harv.) Marechal & al.、ssp. *dekindtiana* (Harms) Verdc.、ssp. *tenuis* (E. Mey.) Marechal & al. 及 ssp. *pubescens* (R. Wilczek) Pasquet。

栽培種豇豆 (*V. unguiculata* spp. *unguiculata*) 起源於非洲且是從ssp. *dekindtiana* (Harms) Verdc. 演化而來，通常再細分為四群(group)：1.栽培化中心在印度的Biflora (cylindrical) Group—短豇豆(catjang, sow-pea

)、2.栽培化中心在東南亞的Sesquipedalis Group—長豇豆(yardlong bean、long-podded cowpea、asparagus bean、Chinese long bean、pea-bean)、3.栽培化中心在西非的Unguiculata Group—黑眼豆(black-eyed pea、southern pea、crowder-pea)及4.Textilis Group。

長豇豆(*V. unguiculata* ssp. *unguiculata* Sesquipedalis Group)：別名菜豆、長豆、米豆、豆角、菜豆仔、飯豆、裙帶豆、紅公豆，原產於印度，可能從黑眼豆中選拔而來，為一年生蔓性草本作物，莢長約50至60公分，呈長筒形，在臺灣則常被稱為菜豆(*P. vulgaris* L.)。性喜溫暖及日照充足的氣候，耐熱性強，耐寒性弱，是東南亞及東亞重要的豆類蔬菜，盛產期在五月至九月。臺灣在鄭成功時代即從大陸引入，經突變及自然雜交，品種頗多，栽培上以蔓性長豇豆為主，需立支架，生長期較長，產量較高，主要產區在屏東縣、彰化縣和高雄市。目前共有青皮、白皮、紅皮及花皮等四種系統，以青皮與白皮系統栽培較為普遍，其中的「三尺青皮」品種不抗病毒病，經本所發展無病毒健康種子繁殖體系生產，並透過農會系統出售，所以又被稱為「農會種」。

短豇豆(*V. unguiculata* ssp. *unguiculata* Biflora Group)：又名眉豆、短莢豇豆、飯豇豆，英文catjang，原生於非洲。一年生直立草本，複葉，頂生小葉卵狀菱形葉，兩側小葉呈斜卵形，先端為短尖狀，邊緣全緣或近全緣。主要作為牧草，有些地方則做糧食作物。Catjang來自於印尼及馬來語kacang，其意為豆類或堅果類。

黑眼豆(*V. unguiculata* ssp. *unguiculata* Unguiculata Group)(common cowpea)：黑眼豆的特徵為種子淡白色，在種臍部位呈現黑色，看起來像一個黑眼睛。黑眼豆通常採收種豆食用，也可採收幼嫩豆莢子或葉子食用。植株直立，約80公分，莢長10-30公分，下垂，內含多粒種子。最初的

目錄

栽培化中心可能在西非，因此大多數非洲栽培種均屬此群，雖然如此，栽培黑眼豆最多的地區卻在亞洲。

纖維用豇豆(*V. unguiculata* ssp. *unguiculata* Textilis Group)：僅栽培於奈及利亞(Nigeria)，主要是從長約60公分的花梗抽取纖維來使用。雖然此群曾從內尼日三角洲(the interior delta of the Niger river)向東傳播至查德湖周圍的盆地(Lake Chad basin)，但目前已逐漸消失。

參考文獻

- 張清安. 1997. 本省應用無病毒種苗之回顧與展望. 植保會刊39:63-73.
- 郭俊毅. 2005. 長豇豆栽培新技術. 臺中區農業專訊 48:19-23.
- IITA. 2015. <http://www.iita.org/>
- Ng, N.Q. and R. Marechal. 1965. Cowpea taxonomy, origin and germplasm, pp.11-21. In: Cowpea Research, Production and Utilization. S. R. Singh and K. O. Rachie (eds.). John Wiley & Sons.
- Norihiko, T., A. Kaga, T. Isemura, D. Vaughan, P. Srinivas, P. Somta, S. Thadavong, C. Bounphanousay, K. Kanyavong, P. Inthapanya, M. Pandiyar, N. Senthil, N. Ramamoorthi, P.K. Jaiwal, Tian Jing, K. Umezawa, and T. Yokoyama. 2011. Vigna Genetic Resources, pp. 11-21. In: The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources: Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna). Tomooka N. and D. A. Vaughan (eds.). National Institute of Agrobiological Sciences, Japan.
- Perrino, P., G. Laghetti, P. L. Spagnoletti Zeuli, and L. M. Monti. 1993. Diversification of cowpea in the Mediterranean and other centres of cultivation. Genetic Resources and Crop Evolution 40(3): 121-132.

94A04502 01	95A06300 25	00A00529 49	05A06354 73
94A04503 02	95A06310 26	00A01188 50	05A06357 74
94A04504 03	95A06317 27	00A01190 51	05A06358 75
94A04505 04	95A06327 28	00A01194 52	05A06361 76
94A04506 05	95A06334 29	00A01196 53	05A06363 77
94A04507 06	95A06338 30	00A03529 54	05A06364 78
94A04508 07	95A06364 31	00A03531 55	05A06370 79
94A04509 08	95A06367 32	00A03532 56	05A06372 80
94A04510 09	95A06369 33	00A03533 57	05A6378 81
94A04511 10	95A06382 34	02A00119 58	05A6381 82
94A04512 11	95A06383 35	02A00120 59	06A00328 83
94A04513 12	95A06388 36	02A00121 60	06A00329 84
94A04515 13	95A06403 37	03A01188 61	06A00338 85
94A04516 14	95A06422 38	03A01189 62	06A00339 86
95A06236 15	95A06423 39	03A01190 63	06A00340 87
95A06238 16	95A06570 40	04A00110 64	06A00341 88
95A06240 17	95A06914 41	04A00114 65	06A00342 89
95A06242 18	97A05077 42	04A00192 66	06A00348 90
95A06248 19	2011A0021143	04A00193 67	06A00350 91
95A06254 20	00A00498 44	04A00196 68	06A00351 92
95A06273 21	00A00503 45	04A00197 69	06A00353 93
95A06288 22	00A00505 46	05A06350 70	06A00356 94
95A06298 23	00A00521 47	05A06351 71	06A00358 95
95A06299 24	00A00527 48	05A06353 72	



94A04502



SAKEMOTO

暫時碼: 94A04502
 品種(系)名稱(中文): 青皮豇豆
 種子長(公厘): 10.58
 種子寬(公厘): 5.71
 種子厚(公厘): 3.77
 種子形狀: 圓扁形
 種皮顏色: 無
 種胚選色: 黑
 種胚頸色: 無
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 15.98
 幼莢莢軸長(公分): 3.16
 主莢莢軸長(公分): 5.35
 主莢粗細(公分): 0.40
 茎色: 綠
 分枝性: 中
 分枝數: 4
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 13.45
 小葉寬(公分): 6.33
 小葉形狀: 鱗形
 葉色: 深綠
 托葉長(公厘): 11.94
 穩型: 短圓型
 穩勢: 密適
 植株色素: 嫩少
 撫種至開花日數(天): 82
 開花至始採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 2
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(朵): 2
 花長(公分): 45.55
 花寬(公分): 7.64
 葉闊(公分): 8.84
 葉黃弯曲度: 稍曲
 葉黃表面: 粗粗糙
 葉黃橫剖面: 圓
 葉黃軟硬: 柔軟
 葉黃筋脈: 無
 葉黃纖細: 少
 葉黃肉質: 酥密
 葉黃肉厚(公厘): 2.90
 葉黃色深: 深
 黃尖色素: 少
 葉尖形: 中
 葉黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 15~16
 種仁配列: 中
 單莢重(公克): 25.64
 最低結莢高度(公分): 21.70
 異梗脫離性: 易



94A04503



003

暫時碼: 94A04503
 品種(系)名稱(中文): 紅仁青皮
 種子長(公厘): 9.39
 種子寬(公厘): 5.65
 種子厚(公厘): 4.05
 種子形狀: 扁圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 紅褐
 種皮斑紋(點)色: 紅褐
 種胚頸色: 深褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 14.52
 幼莢莢軸長(公分): 2.88
 主莢莢軸長(公分): 5.30
 主莢粗細(公分): 0.72
 茎色: 綠
 分枝性: 強
 分枝數: 4
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 12.10
 小葉寬(公分): 8.23
 小葉形狀: 鱗形
 葉色: 深綠
 托葉長(公厘): 15.59
 穩型: 無隱型
 穩勢: 相互旺盛
 植株色素: 稍少
 撫種至開花日數(天): 82
 開花至始採收日數(天): 11
 第一花序著生節位(節): 1
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 白
 每花序著花數(朵): 2~3
 葉長(公分): 22.55
 葉闊(公分): 0.86
 葉厚(公分): 0.77
 葉黃弯曲度: 稍曲
 葉黃表面: 粗粗糙
 葉黃橫剖面: 平
 葉黃軟硬: 柔軟
 葉黃筋脈: 無
 葉黃纖細: 多
 葉黃肉質: 軟鬆
 葉黃肉厚(公厘): 1.05
 葉黃色澤: 漢白
 黃尖色素: 少
 黃尖形: 中
 葉黃老化: 弱
 每莢種仁數(粒): 14~15
 種仁配列: 中
 單莢重(公克): 12.00
 最低結莢高度(公分): 12.60
 異梗脫離性: 易

Vigna unguiculata (L.) Walp. Germplasm Illustrations

94A04504



鑑評碼: 94A04504
品種(系)名稱(中文): 紅皮紅仁
種子長(公釐): 11.59
種子寬(公釐): 5.70
種子厚(公釐): 4.41
種子形狀: 橢圓形
種皮斑紋: 角
種皮底色: 紫
種皮斑紋(點)色: 紅褐
種子顏色: 茶褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 17.55
幼莢莖軸長(公分): 2.91
主莢節間距(公分): 7.35
主莢粗細(公分): 7.30
莢色: 紫
分歧性: 強
分歧習性: 葉腋
繩繞性: 強
小莖長(公分): 14.40
小莖寬(公分): 8.35
小莖葉形: 圓狀披針形
葉色: 深綠
托葉長短(公厘): 12.26
種型: 扁角型
株型: 稚大直莖
植株色調: 中
播種至開花日數(天): 89
開花至莢成熟採收日數(天): 11
第一花序著生節位(節): 4
每—花序花數(朵): 3~4
花色: 白
每花序著花數(朵): 1~2
英長(公分): 46.25
黃寬(公分): 0.87
黃厚(公分): 0.9
嫩莢弯曲度: 热曲
嫩莢直面: 直
嫩莢橫斷面: 圓
嫩莢軟硬: 敏
嫩莢胚乳: 無
嫩莢纖維: 少
嫩莢肉質: 濕潤
嫩莢肉厚(公釐): 2.17
嫩莢色澤: 深
莢尖色澤: 中
莢尖形: 鴟
嫩莢老熟: 嫩
每莢仁數(粒): 19~20
種仁配列: 中
單莢重(公克): 23.40
最底結莢重量(公克): 21.85
莢梗脫離性: 強



94A04505



鑑評碼: 94A04505
品種(系)名稱(中文): 紅皮黑仁
種子長(公釐): 10.25
種子寬(公釐): 5.24
種子厚(公釐): 4.00
種子形狀: 橢圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 黑
種皮頂色: 黑
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 13.73
幼莢莖軸長(公分): 7.85
主莢節間距(公分): 0.43
莢色: 黑
分歧性: 強
分歧習性: 葉腋
繩繞性: 中
小莖長(公分): 9.60
小莖寬(公分): 6.15
小莖葉形: 披針形
葉色: 紫
托葉長短(公厘): 11.15
種型: 扁寬型
株勢: 普通
根群色調: 紫少
單種至開花日數(天): 63
開花至莢成熟採收日數(天): 17
第一花序著生節位(節): 4
每—花序花數(朵): 4
花色: 淡紫紅
每花序著花數(朵): 2~3
英長(公分): 43.40
黃寬(公分): 0.70
黃厚(公分): 0.79
嫩莢弯曲度: 曲
嫩莢表皮: 相當
嫩莢橫斷面: 圓
嫩莢軟硬: 硬
嫩莢胚乳: 無
嫩莢纖維: 少
嫩莢肉質: 濕潤
嫩莢肉厚(公釐): 2.47
嫩莢色澤: 常紅或紫黑
莢仁色調: 少
莢仁形: 雜
嫩莢老熟: 中
每莢種仁數(粒): 19~20
種仁配列: 強
單莢重(公克): 20.90
最底結莢重量(公克): 23.30
莢梗脫離性: 強



94A04506



NARASAD



鑑評碼: 94A04506
 品種(系)名稱(中文): 黑斑豇豆
 穗子長(公厘): 9.95
 穗子寬(公厘): 6.54
 穗子厚(公厘): 5.59
 穗子形狀: 扇圓形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 白
 穗頭環色: 其他
 穗子表皮: 膜質
 百粒穀重(公克): 21.80
 幼苗莖軸粗(公分): 2.53
 主莖節間長(公分): 1.39
 主莖粗(公分): 0.96
 葉色: 深綠
 分枝性: 強
 有稃型株高(公分): 53.67
 分枝節位: 直立
 繼續性: 有
 小葉長(公分): 9.94
 小葉寬(公分): 7.56
 小葉形狀: 圓廣形
 葉色: 深綠
 托葉長焰(公厘): 12.43
 枝型: 斧型
 枝勢: 普通
 穗株色: 無
 接種至開花日數(天): 103
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(朵): 1
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 白
 每花序著黃數(朵): 2~3
 黃長(公分): 16.86
 黃寬(公分): 0.90
 黃厚(公分): 0.80
 葵葉瓣面: 稍曲
 葵黃者直: 平滑
 葵黃瓣面: 略平
 葵黃軟硬: 柔軟
 葵黃延時: 短
 葵葉雄蕊: 中
 葵黃肉質: 中
 葵黃肉厚(公厘): 6.07
 葵黃色澤: 濃綠
 葵黃色素: 少
 黃尖形: 弱
 黃黃者化: 弱
 每莢種仁數(粒): 11~12
 穗仁配列: 中
 莖莢重(公克): 8.07
 最低結莢高度(公分): 10.85
 黃梗脫離性: 易

鑑評碼: 94A04507
 品種(系)名稱(中文): 黑斑青莢
 穗子長(公厘): 10.96
 穗子寬(公厘): 5.65
 穗子厚(公厘): 4.19
 穗子形狀: 扇圓形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 沖綠
 穗皮紋狀(點色): 暗褐
 穗頭環色: 指綠
 穗子表皮: 平滑
 百粒穀重(公克): 13.97
 幼苗莖軸粗(公分): 3.37
 主莖節間長(公分): 12.35
 主莖粗(公分): 0.34
 葉色: 深綠
 分枝性: 強
 分枝節位: 蒜頭
 繼續性: 中
 小葉長(公分): 11.65
 小葉寬(公分): 5.9
 小葉形狀: 長橢圓狀披針形
 葉色: 細
 托葉長焰(公厘): 7.70
 枝型: 穗形
 枝勢: 強
 穗株色: 少
 接種至開花日數(天): 43
 開花至嫩莢採收日數(天): 15
 第一花序著生節位(朵): 2
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 紫
 每花序著黃數(朵): 2~3
 黃長(公分): 48.25
 黃寬(公分): 0.66
 黃厚(公分): 0.88
 葵葉瓣面: 稍曲
 葵黃者直: 略粗糙
 葵黃橫斷面: 椅盤
 葵黃延時: 楊櫻
 葵葉筋脉: 有
 葵葉纖維: 少
 葵葉肉質: 稍鬆
 葵葉肉厚(公厘): 1.19
 葵黃色澤: 濃綠
 葵黃色素: 無
 黃尖形: 弱
 黃黃者化: 弱
 每莢種仁數(粒): 11
 穗仁配列: 弱
 莖莢重(公克): 18.70
 最低結莢高度(公分): 17.60
 黃梗脫離性: 強



94A04507



94A04507



94A04508



94A04508



鑑評碼: 94A04508
 品種(系)名稱(中文):長莢豆
 穗子長(公分): 12.52
 穗子寬(公分): 6.28
 穗子厚(公分): 3.81
 穗子形狀: 扇形
 穗皮斑紋: 有
 穗皮底色: 草綠
 穗皮斑紋(點)色: 草綠
 穗體暗色: 藍綠
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 19.90
 幼莢莖葉總長(公分): 31.30
 主莖節間長(公分): 7.09
 主莖節距(公分): 0.59
 葉色: 雜
 分枝性: 強
 分枝葉性: 葉軸
 繼續性: 中
 小葉長(公分): 11.40
 小葉寬(公分): 7.95
 小葉形狀: 長橢圓狀披針形
 葉色: 深綠
 托葉長焰(公厘): 10.41
 枝型: 無規型
 枝勢: 普通
 穗株色數: 少
 穗種至開花日數(天): 83
 開花至莢實收日數(天): 15
 第一花序著生節位(節): 1
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(莢): 2~3
 莖長(公分): 50.55
 莖寬(公分): 0.87
 莖厚(公分): 0.83
 莖黃綠曲度: 直曲
 莖黃素面: 有
 莖黃橫脈: 有
 莖黃軟硬: 柔軟
 莖黃筋脉: 有
 莖葉邊緣: 中
 莖葉肉質: 薄
 莖葉肉厚(公厘): 2.54
 莖黃色澤: 黃白
 莖尖色素: 無
 莖尖形狀: 尖
 莖莢老化: 中
 每莢重(新莢)(克): 16~17
 穗仁配列: 齒
 穗莢重(公克): 33.70
 最低結莢密度(公分): 14.90
 穗梗腹縫性: 稀

鑑評碼: 94A04509
 品種(系)名稱(中文):初春特長莢豆
 穗子長(公分): 12.55
 穗子寬(公分): 6.71
 穗子厚(公分): 4.34
 穗子形狀: 扇形
 穗皮斑紋: 有
 穗皮底色: 白
 穗皮斑紋(點)色: 草綠
 穗體暗色: 藍綠
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 19.62
 幼莢莖葉總長(公分): 4.00
 主莖節間長(公分): 12.55
 主莖節距(公分): 0.38
 葉色: 深綠
 分枝性: 強
 分枝葉性: 葉軸
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 9.75
 小葉寬(公分): 14.55
 小葉形狀: 長橢圓狀披針形
 葉色: 雜
 托葉長焰(公厘): 11.27
 枝型: 無規型
 枝勢: 強弱
 穗株色數: 少
 穗種至開花日數(天): 100
 開花至莢實收日數(天): 4
 第一花序著生節位(節): 2
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 白
 每花序著花數(莢): 3~4
 莖長(公分): 54.15
 莖寬(公分): 0.85
 莖厚(公分): 0.89
 莖黃綠曲度: 弧曲
 莖黃素面: 有
 莖黃橫脈: 有
 莖黃軟硬: 軟
 莖黃筋脉: 有
 莖葉邊緣: 中
 莖葉肉質: 薄
 莖葉肉厚(公厘): 3.09
 莖黃色澤: 淡綠
 莖尖色素: 無
 莖尖形狀: 尖
 莖莢老化: 中
 每莢重(新莢)(克): 13~14
 穗仁配列: 齒
 穗莢重(公克): 24.50
 最低結莢密度(公分): 18.90
 穗梗腹縫性: 稀




94A04509



94A04509





94A04510



94A04510



鑑評碼: 94A04510
品種(系)名稱(中文): 青長莢豆
種子長(公厘): 12.52
種子寬(公厘): 6.28
種子厚(公厘): 4.25
種子形狀: 球圓形
種皮質地: 軟
種皮斑紋: 有
種皮顏色: 粉色/紅褐
種柄顏色: 淡褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 20.44
幼莢莖粗(公分): 4.37
莖葉節間距(公分): 10.90
莖葉粗(公分): 0.48
莖色: 淡綠
分枝性: 弱
分枝習性: 斜匍匐
纏繞性: 強
小莖長(公分): 11.70
小莖寬(公分): 7.35
小莖形狀: 球圓形
葉色: 綠
托葉長短(公厘): 10.23
種型: 扁角型
種胚: 無
種核色: 黑
種核形狀: 圓
種核表面: 光滑
種核色數(黑): 84
開花至開花日數(天): 9
第一花序著生節位(節): 1
每一花序花數(朵): 3
花色: 淡黃紅
每花序著花數(朵): 2-3
莢長(公分): 34.03
莢寬(公分): 8.67
莢厚(公分): 8.30
莢彎曲度: 略彎曲
嫩莢表皮: 光滑
嫩莢橫斷面: 圓
嫩莢軟硬: 柔軟
嫩莢胚: 有
嫩莢嫩度: 中
嫩莢肉質: 中
嫩莢肉厚(公厘): 2.74
莢黃色素: 微
莢尖色: 黃
莢尖形: 尖
嫩莢老熟: 中
嫩莢老熟(日): 10
種仁配列: 齊
單株產(公克): 21.80
最高結莢高度(公分): 16.00
莢梗縱稜性: 強

鑑評碼: 94A04511
品種(系)名稱(中文): 2戶白豆角
種子長(公厘): 8.19
種子寬(公厘): 8.70
種子厚(公厘): 7.65
種子形狀: 球形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 暗
種皮顏色: 茶褐
種子表面: 細緻
百粒種子重(公克): 32.82
莖葉莖粗(公分): 3.17
莖葉節間距(公分): 1.85
莖葉粗(公分): 1.03
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝習性: 斜匍匐
纏繞性: 強
小莖長(公分): 11.00
小莖寬(公分): 7.60
小莖形狀: 球圓形
葉色: 淡綠
托葉長短(公厘): 15.08
種型: 扇形
種勢: 壯大旺盛
種核色: 黑
種核形狀: 圓
種核表面: 光滑
種核色數(黑): 83
開花至開花日數(天): 15
第一花序著生節位(節): 2
每一花序花數(朵): 3-4
花色: 淡紫紅
每花序著花數(朵): 2-3
莢長(公分): 14.43
莢寬(公分): 1.18
莢厚(公分): 0.83
嫩莢彎曲度: 直
嫩莢表皮: 光滑
嫩莢橫斷面: 扁平
嫩莢軟硬: 柔軟
嫩莢胚: 有
嫩莢嫩度: 多
嫩莢肉質: 中
嫩莢肉厚(公厘): 2.21
嫩莢色澤: 淺綠
莢黃色素: 無
莢尖形: 鋒
嫩莢老熟化: 強
每莢種仁數(粒): 13-14
種仁配列: 齊
單株產(公克): 15.60
最高結莢高度(公分): 15.55
莢梗縱稜性: 強




94A04511



94A04511





94A04512



94A04512



鑑評碼: 94A04512
品種(系)名稱(中文): 蒜頭白豆角
種子長(公厘): 10.50
種子寬(公厘): 5.17
種子厚(公厘): 4.19
種子形狀: 扁圓形
種皮質地: 角
種皮斑紋: 深
種皮斑紋(點)色: 黑
種柄顏色: 無
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 14.70
幼莢莖粗度(公分): 4.07
莖葉節間長短(公分): 3.50
莖葉粗細(公分): 0.43
莖色: 淡綠
分枝性: 弱
分枝習性: 斜匍匐
纏繞性: 弱
小葉長(公分): 8.20
小葉寬(公分): 4.45
小葉形狀: 菓形
葉色: 淡綠
托葉長短(公厘): 11.92
橢型/無羽型
株勢: 細弱
植株色調: 無
播種至開花日數(天): 84
開花至莢果採收日數(天): 13
第一花序著生節位(節): 13
每一花序花數(朵): 3
花色: 白
每花序著花數(朵): 2
莢長(公分): 41.70
莢寬(公分): 0.77
莢厚(公分): 0.89
瓣莢弯曲度: 弯曲
瓣莢表面: 粗糙
瓣莢橫斷面: 圓
瓣莢收窄: 故
瓣莢近尖: 角
瓣莢嫩度: 中
瓣莢肉質: 過熟
瓣莢肉厚(公厘): 2.41
瓣莢色澤: 淡綠
莢尖形: 扇
莢尖形: 鋒
瓣莢老化: 嫩
每莢仁數(粒): 16
種仁配列: 直
單莢重(公克): 14.90
最低結莢高(公分): 13.95
莢梗縱離性: 弱

鑑評碼: 94A04513
品種(系)名稱(中文): 蒜-長白豆
種子長(公厘): 10.99
種子寬(公厘): 5.82
種子厚(公厘): 4.27
種子形狀: 扁圓形
種皮斑紋: 有
種皮底色: 棕
種皮斑紋(點)色: 紅褐
種柄顏色: 銀褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 15.45
幼莢莖粗度(公分): 3.91
莖葉節間長短(公分): 11.14
莖葉粗細(公分): 0.40
莖色: 淡
分枝性: 中
分枝習性: 斜匍匐
纏繞性: 強
小葉長(公分): 8.35
小葉寬(公分): 5.15
小葉形狀: 菓形
葉色: 淡綠
托葉長短(公厘): 9.78
橢型/無羽型
株勢: 直
植株色調: 無
播種至開花日數(天): 97
開花至莢果採收日數(天): 9
第一花序著生節位(節): 5
每一花序花數(朵): 2~3
花色: 淡紫紅
每花序著花數(朵): 1~2
莢長(公分): 50.40
莢寬(公分): 0.74
莢厚(公分): 0.725
瓣莢弯曲度: 曲
瓣莢表面: 相糙
瓣莢橫斷面: 圓
瓣莢收窄: 軟
瓣莢筋線: 無
瓣莢嫩度: 少
瓣莢肉質: 過熟
瓣莢肉厚(公厘): 4.62
瓣莢色澤: 淡綠
莢尖形: 少
莢尖形: 鋒
瓣莢老化: 嫩
每莢仁數(粒): 15.40
種仁配列: 直
單莢重(公克): 25.26
最低結莢高(公分): 26.85
莢梗縱離性: 弱



94A04513



94A04513





94A04515



鑑評碼: 94A04515
 品種(系)名稱(中文): 長青豆角
 種子長(公厘): 11.04
 種子寬(公厘): 6.14
 種子厚(公厘): 4.18
 種子形狀: 窄圓形
 種子紋路: 有
 種皮底色: 棕
 種皮斑紋(點)色: 棕褐
 種柄顏色: 淡褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 15.35
 幼莢莖粗長(公分): 3.61
 主莢莖粗長(公分): 8.9
 主莢粗細(公分): 0.45
 莖色: 深綠
 分枝性: 弱
 分枝習性: 斜匍匐
 繩繩性: 弱
 小莖長(公分): 10.70
 小莖寬(公分): 5.85
 小莖形狀: 圓形
 莖葉: 緋
 托葉長短(公厘): 9.64
 穗型: 球形圓錐
 穗勢: 弱弱
 穗粒色: 棕多
 種種至開花日數(天): 78
 開花至莢黃收日數(天): 14
 第一花序著生節位(分): 2
 每一花序花數(朵): 3
 花色: 淡紫紅
 每花序著生莢數(莢): 3
 莖長(公分): 57.85
 黃實(公分): 0.65
 黃厚(公分): 0.78
 紫莢弯曲度: 弧曲
 紫莢表面: 粗糙
 紫莢橫斷面: 扇平
 紫莢軟硬: 柔軟
 紫莢胚乳: 少
 紫莢肉質: 潤滑
 紫莢肉厚(公厘): 3.84
 紫莢色澤: 淡綠
 莖尖形: 扇
 黃尖形: 钩
 細莢者: 中
 每莢仁數(粒): 12
 種仁配列: 直
 單莢重(公克): 31.70
 番低結莢重(公分): 17.55
 番梗粗細度: 粗

鑑評碼: 94A04516
 后裔種子名稱(中文): 不落架綠生豆角
 品種(系)名稱(英文): TV1007550
 種子長(公厘): 11.51
 種子寬(公厘): 6.65
 種子厚(公厘): 5.03
 種子形狀: 窄圓形
 種皮底色: 有
 種皮斑紋(點)色: 淡
 種皮斑紋(點)色: 棕褐
 種柄顏色: 淡綠
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 14.31
 幼莢莖粗長(公分): 3.18
 主莢莖粗長(公分): 1.35
 主莢粗細(公分): 0.71
 莖色: 淡綠
 分枝性: 弱
 分枝習性: 斜匍匐
 繩繩性: 弱
 小莖長(公分): 10.00
 小莖寬(公分): 7.60
 小莖形狀: 圓形
 莖葉: 淡綠
 托葉長短(公厘): 12.18
 穗型: 有限型
 穗勢: 普通
 穗株數: 少
 種種至開花日數(天): 97
 開花至莢黃收日數(天): 9
 第一花序著生節位(分): 1
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 淡紫紅
 每花序著生莢數(莢): 2~3
 黃實(公分): 37.70
 黃厚(公分): 0.74
 黃寬(公分): 0.70
 紫莢弯曲度: 弧曲
 紫莢表面: 平滑
 紫莢橫斷面: 扇
 紫莢軟硬: 柔軟
 紫莢胚乳: 少
 紫莢肉質: 潤滑
 紫莢肉厚(公厘): 2.73
 紫莢色澤: 淡綠
 莖尖形: 扇
 黃尖形: 钩
 細莢者: 中
 每莢仁數(粒): 14.20
 種仁配列: 直
 單莢重(公克): 18.93
 番低結莢重(公分): 15.25
 番梗粗細度: 粗



94A04516





95A06236




暫稱碼: 95A06236
品種(系)名稱(英文): PI 173613
種子長(公厘): 7.67
種子寬(公厘): 5.53
種子厚(公厘): 4.98
種子形狀: 長圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 綠
種臍暗色: 茶褐
種子表面: 中
百粒種子重(公克): 12.58
主莢節間距(公分): 12.00
莖色: 綠
分枝性: 中
分枝性: 密
纏繞性: 強
小葉長(公分): 7.50
小葉寬(公分): 6.00
小葉形狀: 雜亂形
葉色: 綠
株型: 無頂莖
株勢: 直
莢桿色: 紫
播種至開花日數(天): 39
開花至始採收日數(天): 4
第一花序著生新位(節): 4
每一花序花數(朵): 4-5
花色: 淡紫紅
花序序長(公分): 1-2
莢長(公分): 16.10
莢寬(公分): 0.69
莢厚(公分): 0.59
嫩莢嘴頭度: 楔曲
嫩莢表面: 光滑
嫩莢橫剖面: 墓圓
嫩莢肉質: 滑嫩
嫩莢色澤: 綠
莢尖色澤: 紫
莢尖形: 尖
嫩莢老化: 中
每英種仁數(粒): 13
種仁配列: 密
單莢重(公克): 5.12
最低結莢密度(公分): 7.00
莢裡胚顯性: 無

暫稱碼: 95A06238
品種(系)名稱(英文): PI 173827
種子長(公厘): 7.77
種子寬(公厘): 6.13
種子厚(公厘): 4.80
種子形狀: 圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 淡褐
種臍暗色: 茶褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 13.09
近莢莢節間距(公分): 2.83
主莢節間距(公分): 11.20
莖色: 綠
分枝性: 強
分枝屬性: 開展
纏繞性: 強
小葉長(公分): 10.35
小葉寬(公分): 9.10
小葉形狀: 其他
葉色: 深綠
托葉長短(公厘): 18.83
株型: 半半吊型
莢桿色: 紫
播種至開花日數(天): 97
開花至嫩莢採收日數(天): 4
第一花序著生新位(節): 2
單一花序花數(朵): 2-3
花色: 紫
花序序長(公分): 1-2
莢長(公分): 15.25
莢寬(公分): 0.85
莢厚(公分): 0.71
嫩莢嘴頭度: 楔曲
嫩莢表面: 光滑
嫩莢橫剖面: 墓平
嫩莢肉質: 滑嫩
嫩莢色澤: 紫
莢尖形: 尖
嫩莢老化: 中
每英種仁數(粒): 13-14
種仁配列: 密
單莢重(公克): 8.90
最低結莢密度(公分): 10.65
莢裡胚顯性: 無




95A06238





95A06240



暫評號: 95A06240
品種(系)名稱(英文): PI 174965
種子長(公厘): 8.78
種子寬(公厘): 6.46
種子厚(公厘): 4.87
種子形狀: 柱形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 綠
種臍環色: 墓褐
種子表面: 中
百粒種子重(公克): 13.86
主莖節間長短(公分): 2.50
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝習性: 蔓匍
纏繞性: 中
小葉長(公分): 11.50
小葉寬(公分): 8.30
小葉形狀: 雜狀披針形
葉色: 淺綠
株型: 無莖莧
株勢: 直立
種株色素: 無
播種至開花日數(天): 41
開花至莢實採收日數(天): 11
第一花序著生節位(節): 4
每一花序花數(朵): 2~3
花色: 紫
花芻序著花數(莢): 5~6
莢長(公分): 14.70
莢寬(公分): 0.73
莢厚(公分): 0.65
嫩莢體曲度: 曲
嫩莢表面: 較粗糙
嫩莢質地: 機械
嫩莢肉質: 濕密
嫩莢色澤: 黃白
莢尖色澤: 黑
莢尖形狀: 中
嫩莢老熟: 快
每莢種子數(粒): 16
種仁配比: 中
單莢重(公克): 4.91
最低結莢率(公分): 7.00
莢梗脫離性: 易

暫評號: 95A06242
品種(系)名稱(英文): PI 175332
種子長(公厘): 9.00
種子寬(公厘): 6.54
種子厚(公厘): 4.96
種子形狀: 柱形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 白
種臍環色: 其他
種子表面: 細緻
百粒種子重(公克): 18.51
主莖節間長短(公分): 2.17
主莖粗細(公分): 0.47
莖色: 綠
分枝性: 強
分枝習性: 蔓匍
纏繞性: 強
小葉長(公分): 9.83
小葉寬(公分): 7.00
小葉形狀: 嵌形
葉色: 淺綠
主莖長短(公厘): 8.09
株型: 扇葉型
株勢: 直通
種株色素: 少
播種至開花日數(天): 70
開花至莢實採收日數(天): 7
第一花序著生節位(節): 2
每一花序花數(朵): 2~3
花色: 白
花芻序著花數(莢): 1~2
莢長(公分): 18.75
莢寬(公分): 0.77
莢厚(公分): 0.68
嫩莢體曲度: 稍曲
嫩莢表面: 較粗糙
嫩莢質地: 機械
嫩莢肉質: 稍軟
嫩莢老熟: 有
嫩莢種仁: 少
嫩莢肉質: 蒜頭
嫩莢肉厚(公厘): 1.89
嫩莢色澤: 濕綠
莢尖色素: 少
莢尖形狀: 圓
嫩莢老熟: 中
每莢種子數(粒): 12~13
種仁配比: 中
單莢重(公克): 10.60
最低結莢率(公分): 11.83
莢梗脫離性: 易



95A06242






95A06248



鑑評碼: 95A06248
品種(系)名稱(英文): PI 177578
種子長(公厘): 8.17
種子寬(公厘): 4.96
種子厚(公厘): 3.99
種子形狀: 扁圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 淡黃
種臍暗色: 淺褐
種子表面: 中
百粒種子重(公克): 10.13
主莖節間長短(公分): 4.60
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝節位: 葉腋
纏繞性: 強
小葉長(公分): 12.70
小葉寬(公分): 9.50
小葉形狀: 扇形
葉色: 綠
株型: 斜升型
株勢: 稍大直
植株色素: 無
播種至開花日數(天): 39
開花至始莢採收日數(天): 10
第一花序著生節位(節): 5
每一花序花數(朵): 1~2
花色: 淡紫紅
每花序著莢數(朵): 2~3
莢長(公分): 17.60
莢寬(公分): 0.85
莢厚(公分): 0.71
嫩莢弯曲度: 直
嫩莢表面: 光滑
嫩莢橫斷面: 橢圓
嫩莢肉質: 厚
嫩莢黃色: 淡綠
莢尖色素: 中



95A06254



鑑評碼: 95A06254
品種(系)名稱(英文): PI 179553
種子長(公厘): 67.61
種子寬(公厘): 5.84
種子厚(公厘): 4.94
種子形狀: 扁圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 淡
種臍環色: 暗褐
種子表面: 中
百粒種子重(公克): 8.84
主莖節間長短(公分): 3.10
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝節位: 直立
纏繞性: 強
小葉長(公分): 9.00
小葉寬(公分): 7.90
小葉形狀: 葵葉披針形
葉色: 綠
株型: 扁圓型
株勢: 直立
植株色素: 無
播種至開花日數(天): 37
開花至莢莢採收日數(天): 7
第一花序著生節位(節): 3
每一花序花數(朵): 7~8
花色: 淡紫紅
每花序著莢數(朵): 3~4
莢長(公分): 18.80
莢寬(公分): 0.96
莢厚(公分): 0.76
嫩莢弯曲度: 直
嫩莢表面: 光滑
嫩莢橫斷面: 橢圓
嫩莢肉質: 厚
嫩莢黃色: 淡綠
莢尖色素: 無
莢尖形: 中
莢老熟化: 中
耐黃曲霉(數/個): 20
根仁配列: 差
單莢重(公克): 9.02
最低結莢高度(公分): 14.50
莢壁堅韌性: 弱




95A06273




蓄株碼: 95A06273
品種(系)名稱(英文): PI 189360
種子長(公厘): 6.02
種子寬(公厘): 5.57
種子厚(公厘): 3.52
種子形狀: 橢圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 紅
種體頂色: 深褐
種子表面: 中
百粒種子重(公克): 8.45
生莖節間長短(公分): 2.00
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝習性: 葉腋
纏繞性: 強
小葉長(公分): 10.50
小葉寬(公分): 8.00
小葉形狀: 褐狀披針形
葉色: 綠
株型: 斜現型
株勢: 粗大直立
植株色素: 紅
播種至開花日數(天): 44
開花至全莖採收日數(天): 7
第一花序著生節位(節): 6
每一花序花數(朵): 2~3
花色: 淡紫紅
每花序著生莢數(莢): 2~3
莢長(公分): 15.10
莢寬(公分): 0.82
莢厚(公分): 0.63
嫩莢弯曲度: 直
嫩莢表皮: 光滑
嫩莢種子面: 平
嫩莢肉質: 濕密
嫩莢黃澤: 茶
莢尖色: 紫
莢尖形: 钩
嫩莢老化: 中
每莢種仁數(粒): 15
種仁配比: 壓
單莢重(公克): 4.80
最低結莢密度(公分): 14.80
莢種仁雜性: 純

蓄株碼: 95A06288
品種(系)名稱(英文): PI 189374
種子長(公厘): 6.59
種子寬(公厘): 4.50
種子厚(公厘): 3.92
種子形狀: 橢圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 紅
種體頂色: 茶褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 7.93
生莖節間長短(公分): 2.90
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝習性: 葉腋
纏繞性: 中
小葉長(公分): 13.80
小葉寬(公分): 9.70
小葉形狀: 褐狀披針形
葉色: 綠
株型: 斜現型
株勢: 粗大直立
植株色素: 紅
重種至開花日數(天): 24
開花至全莖採收日數(天): 4
第一花序著生節位(節): 4
每一花序花數(朵): 5~6
花色: 白
每花序著生莢數(莢): 2~3
莢長(公分): 13.00
莢寬(公分): 0.65
莢厚(公分): 0.58
嫩莢弯曲度: 曲
嫩莢表皮: 平滑
嫩莢種子面: 平
嫩莢肉質: 濕密
嫩莢黃澤: 茶
莢尖色: 紫
莢尖形: 安
嫩莢老化: 中
每莢種仁數(粒): 14
種仁配比: 別混
單莢重(公克): 3.26
最低結莢密度(公分): 17.50
莢種仁雜性: 純



95A06288






95A06298




暫時碼: 95A06298
 品種(系)名稱(英文): PI194206
 種子長(公厘): 7.38
 種子寬(公厘): 5.70
 種子厚(公厘): 3.81
 種子形狀: 離圓形
 種皮紋路: 無
 種皮底色: 褐綠
 種臍環色: 深褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 11.55
 主莢節間長短(公分): 3.40
 莖色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝單性: 葉腋
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 9.80
 小葉寬(公分): 7.80
 小葉形狀: 近橢形
 葉色: 綠
 葉型: 無托葉
 茎勢: 直
 植株色素: 無
 撫種至開花日數(天): 56
 開花至始英採收日數(天): 6
 第一花序著生部位(節): 4
 每一花序花數(朵): 4~5
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(朵): 2~3
 英長(公分): 13.30
 英寬(公分): 0.89
 英厚(公分): 0.72
 蔴莢彎曲度: 曲
 蔴莢表面: 脫毛
 蔴莢斷面: 圓圓
 蔴莢肉質: 嫩
 蔴莢色澤: 淡綠
 蔴莢色素: 無
 莖尖形: 尖
 莖黃老化: 優
 每莢種仁數(粒): 14
 種仁配列: 直
 單莢重(公克): 8.13
 最低結莢高度(公分): 11.50
 花梗脫離點:

暫時碼: 95A06299
 品種(系)名稱(英文): PI194207
 種子長(公厘): 8.44
 種子寬(公厘): 6.39
 種子厚(公厘): 4.82
 種子形狀: 離圓形
 種皮紋路: 無
 種皮底色: 暗
 種臍環色: 茶褐色
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 11.90
 主莢節間長短(公分): 5.00
 莖色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝單性: 葉腋
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 12.70
 小葉寬(公分): 10.90
 小葉形狀: 扇狀披針形
 葉色: 綠
 葉型: 扇圓型
 茎勢: 直
 植株色素: 無
 撫種至開花日數(天): 47
 開花至始英採收日數(天): 6
 第一花序著生部位(節): 4
 每一花序花數(朵): 1~2
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 2~3
 英長(公分): 18.60
 英寬(公分): 0.90
 英厚(公分): 0.77
 蔴莢彎曲度: 直
 蔴莢表面: 脫毛
 蔴莢橫斷面: 圓圓
 蔴莢肉質: 嫩
 蔴莢色澤: 淡綠
 蔴莢色素: 無
 莖尖形: 尖
 莖黃老化: 優
 每莢種仁數(粒): 16
 種仁配列: 中
 單莢重(公克): 6.83
 最低結莢高度(公分): 22.00
 異株脫離性: 易



95A06299





95A06300




蓄株號: 95A06300
 品種(系)名稱(英文): PI 194268
 種子長(公厘): 8.55
 種子寬(公厘): 5.87
 種子厚(公厘): 4.22
 種子形狀: 圓筒形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 褐
 種瓣顏色: 茶褐色
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 17.23
 主莢節間長度(公分): 4.00
 葉色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝習性: 斜
 繩結性: 中
 小葉長(公分): 8.40
 小葉寬(公分): 6.30
 小葉形狀: 雞爪狀披針形
 葉色: 綠
 株型: 無扭葉
 株勢: 貫通
 植株色素: 無
 整株至開花日數(天): 40
 開花至始黃豆收日數(天): 8
 第一花序著生部位(節): 4
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 2~3
 英長(公分): 15.40
 英寬(公分): 0.72
 英厚(公分): 0.64
 繩莢彎曲度: 曲
 繩莢表面: 光滑
 繩莢橫斷面: 圓
 繩莢肉質: 滑
 繩莢色澤: 淡
 繩尖色: 紫
 繩尖形: 尖
 莖黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 13
 種仁計列: 密
 單莢重(公克): 5.46
 最低結莢高度(公分): 14.00
 黃梗脫離性: 易

蓄株號: 95A06310
 品種(系)名稱(英文): PI 200867
 種子長(公厘): 7.50
 種子寬(公厘): 5.91
 種子厚(公厘): 3.96
 種子形狀: 球形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 棕
 種瓣顏色: 暗紅褐色
 種子表面: 光滑
 百粒種子重(公克): 9.57
 主莢節間長度(公分): 3.60
 葉色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝習性: 衡需
 繩結性: 中
 小葉長(公分): 11.10
 小葉寬(公分): 9.00
 小葉形狀: 近橢圓形
 葉色: 綠
 株型: 無扭葉
 株勢: 貫通
 植株色素: 無
 整株至開花日數(天): 49
 開花至始黃豆收日數(天): 7
 第一花序著生部位(節): 5
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 2~3
 英長(公分): 16.90
 英寬(公分): 0.91
 英厚(公分): 0.67
 繩莢彎曲度: 直
 繩莢表面: 光滑
 繩莢橫斷面: 細粗雜
 繩莢肉質: 滑
 繩莢色澤: 淡綠
 繩尖色: 紫
 繩尖形: 尖
 莖黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 15
 種仁計列: 密
 單莢重(公克): 6.81
 最低結莢高度(公分): 23.50
 黃梗脫離性: 無



95A06310





95A06317



鑑評碼: 95A06317

品種(系)名稱(英文): PI 205241

種子長(公厘): 6.26

種子寬(公厘): 5.12

種子厚(公厘): 4.25

種子形狀(圓度):

種皮斑紋:無

種皮花色:綠

種皮邊色:茶褐

種子表面:中

百粒種子重(公克): 7.06

主莢節間長(公分): 2.90

葉色:淡綠

分枝習性:簇生

纏繞性:強

小葉長(公分): 8.80

小葉寬(公分): 6.50

小葉形狀:卵狀披針形

葉緣:鋸齒

株型:無莖型

株勢:直立

植株色素:無

播種至開花日數(天): 51

開花至始黃採收日數(天): 8

第一花序著生節位(節): 4

每一花序花數(朵): 4~5

花色:淡紫紅

每花序著生葉數(葉): 1~2

莢長(公分): 13.80

莢寬(公分): 0.66

莢厚(公分): 0.56

莢黃綠曲度:直

嫩莢青白:絕少

嫩莢黃曲:微有

嫩莢肉質:中

嫩黃色澤:淡綠

嫩葉色澤:無

葉尖形:尖

嫩葉老化:中

每莢種仁數(粒): 14

種仁配列:中

單莢重(公克): 3.78

最高結莢莢高度(公分): 8.00

莢梗脫離易

鑑評碼: 95A06327

品種(系)名稱(英文): PI 211755

種子長(公厘): 6.04

種子寬(公厘): 5.27

種子厚(公厘): 4.37

種子形狀:橢圓形

種皮斑紋:無

種皮底色:褐

種皮邊色:茶褐

種子表面:平滑

百粒種子重(公克): 8.54

主莢節間長(公分): 5.60

葉色:淡綠

分枝習性:強

分枝耐性:高

纏繞性:強

小葉長(公分): 8.90

小葉寬(公分): 6.20

小葉形狀:卵狀披針形

葉緣:鋸齒

株型:無莖型

株勢:粗大直立

植株色素:無

播種至開花日數(天): 66

開花至嫩莢採收日數(天): 7

第一花序著生節位(節): 4

每一花序花數(朵): 2~3

花色:淡紫紅

每花序著生葉數(葉): 2~3

莢長(公分): 15.50

莢寬(公分): 0.70

莢厚(公分): 0.66

嫩莢黃綠曲度:直

嫩莢青白:絕少

嫩莢黃曲:無

嫩莢肉質:嫩

嫩黃色澤:淡綠

葉尖形:中

嫩葉老化:中

每莢種仁數(粒): 15

種仁配列:密

單莢重(公克): 5.50

最高結莢莢高度(公分): 13.50

莢梗脫離易



95A06327





95A06334



暫時碼: 95A06334
品種(系)名稱(英文): PI 214354
種子長(公厘): 7.34
種子寬(公厘): 5.21
種子厚(公厘): 4.07
種子形狀: 扁圓形
種皮斑點: 無
種皮色: 綠
種臍環色: 桃紅
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 8.62
主莢節間長短(公分): 9.50

莖色: 淡綠
分枝性: 弱
分枝節位: 葉軸
纏繞性: 強
小葉長(公分): 8.90
小葉寬(公分): 6.70
小葉形狀: 直狀形
葉色: 綠
株型: 無莖型
株數: 莖
播種至開花日數(天): 55
開花至始收採果日數(天): 8
第一花序著生節位(節): 4
每一花序花數(朵): 1~2
花色: 淡紫紅


每花序著花數(朵): 3~4
葉長(公分): 15.70
葉寬(公分): 0.65
葉厚(公分): 0.58
葉黃彎曲度: 由
葉黃表面: 有粗稜
葉黃邊緣: 有平
葉黃葉肉: 有軟
葉黃葉肉: 少
葉黃肉質: 嚙密
葉黃台灣: 沒錄
黃黃色素: 無
莢尖形: 中
嫩莢老仁: 有
嫩莢種子數(粒): 14
種仁形: 扁圓
單英重(公克): 4.15
最長莢節間長度(公分): 15.00
莢梗脫落性: 易

暫時碼: 95A06338
品種(系)名稱(英文): PI 222010
種子長(公厘): 10.09
種子寬(公厘): 5.78
種子厚(公厘): 4.06
種子形狀: 扁圓形
種皮斑點: 有
種皮色: 綠
種皮斑紋(點)色: 紅褐色
種臍環色: 桃紅
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 13.30
主莢節間長短(公分): 6.50
莖色: 淡綠
分枝性: 強
分枝節位: 葉軸
纏繞性: 強
小葉長(公分): 9.20
小葉寬(公分): 7.00
小葉形狀: 斜橢圓狀針形
葉色: 綠
株型: 無莖型
株數: 莖
種子色素: 無
播種至開花日數(天): 64
開花至始收採果日數(天): 9
第一花序著生節位(節): 4
第一花序花數(朵): 3~4
花色: 淡紫紅
花序著花數(朵): 1~2
葉長(公分): 16.4
葉寬(公分): 0.66
葉厚(公分): 0.69
嫩莢彎曲度: 直
嫩莢表面: 平滑
嫩莢橫斷面: 扇圓
嫩莢軟硬: 軟軟
嫩莢節絲: 無
嫩莢屬性: 少
嫩莢肉質: 中
嫩莢黃色素: 沒錄
莢尖形: 尖
嫩莢老化中
嫩莢種仁數(粒): 12
種仁形: 扁中
單英重(公克): 4.99
最長莢節間長度(公分): 8.50
莢梗脫落性: 易




95A06338






95A06364



鑑評碼: 95A06364
 品種(系)名稱(英文): PI 229734
 種子長(公厘): 6.75
 種子寬(公厘): 6.41
 種子厚(公厘): 5.21
 種子形狀: 楊桃形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 白
 種臍環色: 暗褐
 種子表面: 細滑
 百粒種子重(公克): 14.34
 幼莢胚軸長(公分): 2.33
 主莢節軸(直角型): 3
 主莢節側枝(直角型): 0.83
 主莢矩短(公分): 0.83
 葉色: 深綠
 分枝習性: 中
 分枝葉性: 直立
 錄繩性: 強
 有芒型株高(公分): 28.67
 小葉長(公分): 9.15
 小葉寬(公分): 9.90
 小葉形狀: 圓形
 葉緣: 邊緣
 托葉舌短(公厘): 8.26
 枝型: 有刺型
 枝勢: 普通
 構株色: 無
 撫種至開花日數(天): 69
 開花至嫩莢採收日數(天): 8
 第一花序著生節位(節): 1
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 白
 每花序著花數(朵): 1~2
 黃根(公分): 15.75
 黃莖(公分): 0.87
 黃厚(公分): 0.71
 紫黃瓣曲直: 直曲
 紫莖葉質: 平滑
 紫莖橫面: 直平
 紫莖軟硬: 優
 紫莖葉緣: 莓
 紫莖葉維: 中
 紫莖肉質: 膿弱
 紫莖肉厚(公厘): 0.77
 紫黃色澤: 淺
 黃尖色素: 中
 黃尖形: 中
 細黃老化: 慢
 細黃種仁(粒): 13~14
 種仁配列: 密
 單莢重(公克): 6.20
 罩低結莢厚度(公分): 4.00
 黃梗脫附性: 易

鑑評碼: 95A06367
 品種(系)名稱(英文): PI 244571
 種子長(公厘): 8.24
 種子寬(公厘): 6.30
 種子厚(公厘): 4.97
 種子形狀: 球形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 淡褐
 種皮明紋(點)色: 紅褐
 種臍環色: 淡褐
 種子表面: 平滑
 吉拉種子重(公克): 14.52
 幼莢胚軸長(公分): 2.98
 主莢節側枝(直角型): 2.00
 主莢矩短(公分): 1.00
 葉色: 綠
 分枝習性: 強
 分枝葉性: 直立
 錄繩性: 強
 有芒型株高(公分): 67.40
 小葉長(公分): 10.90
 小葉寬(公分): 9.15
 小葉形狀: 椭圓形
 葉緣: 邊緣
 托葉舌短(公厘): 15.10
 枝型: 有隙型
 枝勢: 強大壯旺
 構株色: 無
 撫種至開花日數(天): 97
 開花至嫩莢採收日數(天): 4
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 1~2
 黃根(公分): 15.80
 黃莖(公分): 0.90
 黃厚(公分): 0.74
 紫黃瓣曲直: 曲
 紫莖葉質: 平滑
 紫莖橫面: 橢圓
 紫莖軟硬: 優
 紫莖葉緣: 有
 紫莖葉維: 多
 紫莖肉質: 膿弱
 紫莖肉厚(公厘): 0.92
 紫黃色澤: 淺
 黃尖色素: 少
 黃尖形: 莓
 細黃老化: 快
 細黃種仁(粒): 13~14
 種仁配列: 密
 單莢重(公克): 7.90
 罩低結莢厚度(公分): 19.50
 黃梗脫附性: 易



95A06367





95A06369




暫時碼: 95A06369
品種(系)名稱(英文): PI 246132
種子長(公厘): 7.14
種子寬(公厘): 6.64
種子厚(公厘): 5.09
種子形狀: 球形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 淡
種皮邊緣色: 茶褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 13.87
幼莢莢莢長(公分): 2.54
主莢莢莢長(公分): 1.50
主莢莢組(公分): 0.60
莢色: 綠
分枝性: 弱
分枝密性: 葵葉
纏繞性: 中
小葉長(公分): 10.75
小葉寬(公分): 10.15
小葉形狀: 雞爪狀針形
葉色: 綠
托葉長短(公厘): 7.98
株型: 半灌生
株勢: 直
植株株數: 無
擡種至開花日數(天): 75
開花至莢莢採收日數(天): 5
第一花序著生節位(節): 2
每一花序芻數(分): 2~3
花色: 紫
每花序著莢數(莢): 1~2
莢長(公分): 18.45
莢寬(公分): 0.81
莢厚(公分): 0.65
嫩黃瓣曲度: 直曲
嫩黃表面: 平滑
嫩黃橫斷面: 楔平
嫩黃數: 稀數
嫩黃胚絲: 有
嫩黃種胚: 少
嫩黃肉質: 嚇肥
嫩黃肉厚(公厘): 1.05
嫩黃色澤: 淡
莢尖色素: 無
莢尖形: 钩
嫩黃老仁: 中
每莢種仁數(粒): 15~16
種仁配列: 中
單莢重(公克): 6.1
最高低基莢高(公分): 12.0
莢模版離生: 易



95A06382



暫時碼: 95A06382
品種(系)名稱(英文): PI 255773
種子長(公厘): 8.75
種子寬(公厘): 6.26
種子厚(公厘): 4.41
種子形狀: 腋圓形
種皮斑紋: 無/有
種皮底色: 淡褐
種皮邊緣色: 紅褐
種皮邊緣色: 茶褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 15.10
幼莢莢莢長(公分): 3.00
主莢莢莢長(公分): 2.10
主莢莢組(公分): 0.93
莢色: 淡綠
分枝性: 中
分枝密性: 葵葉
纏繞性: 弱
小葉長(公分): 10.85
小葉寬(公分): 8.80
小葉形狀: 雞爪形
葉色: 綠
托葉長短(公厘): 11.44
株型: 半直半攀型
株勢: 大而旺盛
植株株數: 稍少
種株至開花日數(天): 97
開花至莢莢採收日數(天): 4
第一花序著生節位(節): 4
每一花序芻數(分): 2~3
花色: 白
每花序著莢數(莢): 3~4
莢長(公分): 21.46
莢寬(公分): 0.87
莢厚(公分): 0.66
嫩黃瓣曲度: 曲
嫩黃表面: 平滑
嫩黃橫斷面: 楔平
嫩黃胚絲: 坚硬
嫩黃種胚: 有
嫩黃肉質: 嚇肥
嫩黃肉厚(公厘): 0.83
嫩黃色澤: 淡綠
莢尖色素: 無
莢尖形: 中
嫩黃老仁: 細
每莢種仁數(粒): 15~16
種仁配列: 底
單莢重(公克): 14.10
最高低基莢高(公分): 12.35
莢模版離生: 易



95A06383



95A06383

鑑評碼: 95A06383
 品種(系)名稱(英文): PI 255774
 種子長(公厘): 7.73
 種子寬(公厘): 6.11
 種子厚(公厘): 4.38
 種子形狀: 球形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 白
 種皮澤色: 淡褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 11.20
 幼莢胚軸長(公分): 2.08
 主莢節數(角形型): 3
 主莢節間隙(公分): 2.00
 主莢組細(公分): 0.43
 莖色: 紫
 分枝性: 強
 分枝密性: 密
 繩繩性: 強
 有莢型株高(公分): 42.50
 小葉長(公分): 9.20
 小葉寬(公分): 8.45
 小葉形狀: 鋸形
 莖色: 紫
 托葉舌短(公厘): 10.83
 枝型: 有莢型
 枝勢: 直大旺盛
 構株色度: 少
 播種至開花日數(天): 65
 開花至嫩莢採收日數(天): 7
 第一花序著生節位(節): 1
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 白
 每花序著花數(朵): 1~2
 黃根(公分): 20.25
 黃寬(公分): 0.67
 黃厚(公分): 0.61
 黃黃瓣曲度: 曲
 黃黃瓣表質: 平滑
 黃黃橫面: 橫面
 黃黃缺梗: 朝側
 黃黃筋脈: 莖
 黃黃維維: 中
 黃黃肉質: 中
 黃黃肉厚(公厘): 1.59
 黃黃色澤: 淺
 黃尖色素: 中
 黃尖形: 中
 黃老化: 慢
 雜莢種仁數(粒): 15~16
 種仁配列: 整
 單莢重(公克): 9.60
 最低結莢厚度(公分): 6.83
 黃硬脫附性: 易

鑑評碼: 95A06388
 品種(系)名稱(英文): PI 255784
 種子長(公厘): 7.80
 種子寬(公厘): 6.15
 種子厚(公厘): 4.85
 種子形狀: 球形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 淡褐
 種皮澤色: 暗褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 14.55
 幼莢胚軸長(公分): 2.75
 主莢節間隙(公分): 2.30
 主莢組細(公分): 0.97
 莖色: 紫
 分枝性: 強
 分枝密性: 密
 繩繩性: 無
 有莢型株高(公分): 66.90
 構株(公分): 62.79
 小葉長(公分): 7.45
 小葉寬(公分): 8.15
 小葉形狀: 鋸形
 莖色: 紫
 托葉舌短(公厘): 12.71
 枝型: 有莢型
 枝勢: 直大旺盛
 構株色度: 無
 播種至開花日數(天): 83
 開花至嫩莢採收日數(天): 10
 第一花序著生節位(節): 1
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 2~3
 黃根(公分): 17.20
 黃寬(公分): 0.80
 黃厚(公分): 0.67
 黃黃瓣曲度: 曲
 黃黃表質: 粗糙
 黃黃橫面: 露平
 黃黃缺梗: 乾
 黃黃筋脈: 有
 黃黃維維: 多
 黃黃肉質: 中
 黃黃肉厚(公厘): 0.82
 黃黃色澤: 淺
 黃尖色素: 無
 黃尖形: 中
 黃老化: 快
 雜莢種仁數(粒): 15~16
 種仁配列: 整
 單莢重(公克): 9.70
 最低結莢厚度(公分): 16.45
 黃硬脫附性: 易



95A06388



95A06388





95A06403



95A06403



鑑評碼: 95A06403
 品種(系)名稱(英文): PI 269664
 種子長(公厘): 6.84
 種子寬(公厘): 4.87
 種子厚(公厘): 3.87
 種子形狀:橢圓形
 種皮斑紋:有
 種皮花色:淡褐
 種皮斑紋(點)色:褐褐
 種皮澤色:暗褐
 種子表面:平滑
 百粒種子重(公克): 8.07
 幼莢莖軸粗(公分): 1.82
 主莢莖節間距(公分): 1.50
 主莢粗細(公分): 0.70
 葉色:淡綠
 分枝性:中
 分枝適性:適
 鐵線性:強
 小葉長(公分): 8.05
 小葉寬(公分): 7.05
 小葉形狀:橢圓形
 葉色:濃綠
 托葉長短(公厘): 8.60
 枝型:無現型
 枝勢:直
 植株色素:少
 植株至開花日數(天): 83
 開花至收穫日數(天): 7
 第一花序著生節位(節): 1
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色:紫
 每花序著花數(英): 2~3
 英長(公分): 12.20
 英寬(公分): 0.64
 英厚(公分): 0.56
 葉黃曲度:稍曲
 葉黃否:平滑
 葉黃橫斷面:扁平
 葉黃軟硬:硬
 葉黃筋脈:無
 蔴莢纖維:中
 蔴莢肉質:淡鬆
 蔴莢肉厚(公厘): 0.43
 蔴莢色澤:綠
 蒜尖色素:少
 蒜尖形:尖
 蔴莢老化:快
 蔴莢仁熟(熟): 11~12
 穗仁配列:密
 穗毛結莢高度(公分): 13.30
 莖梗脫離性:易

鑑評碼: 95A06422
 品種(系)名稱(英文): PI 291096
 種子長(公厘): 6.43
 種子寬(公厘): 6.12
 種子厚(公厘): 4.78
 種子形狀:球形
 種皮斑紋:有
 種皮底色:淡褐
 種皮斑紋(點)色:紅褐
 種皮澤色:茶褐
 種子表面:平滑
 吉粒種子重(公克): 13.06
 幼莢莖軸粗(公分): 2.07
 主莢莖節間距(公分): 7.75
 主莢粗細(公分): 1.01
 葉色:淡綠
 分枝性:強
 分枝適性:適
 鐵線性:中
 小葉長(公分): 9.55
 小葉寬(公分): 11.81
 小葉形狀:橢圓形
 葉色:綠
 托葉長短(公厘): 10.12
 枝型:半肉棍型
 枝勢:粗大旺盛
 植株色素:無
 植株至開花日數(天): 97
 開花至收穫日數(天): 4
 第一花序著生節位(節):
 每一花序花數(朵): 2
 花色:紫
 每花序著花數(英): 3~4
 英長(公分): 14.85
 英寬(公分): 0.79
 英厚(公分): 0.68
 葉黃曲度:曲
 葉黃底色:平滑
 葉黃橫斷面:橢圓
 葉黃軟硬:硬
 葉黃筋脈:有
 蔴莢纖維:多
 蔴莢肉質:淡鬆
 蔴莢肉厚(公厘): 1.01
 蔴莢色澤:淡綠
 蒜尖色素:少
 蒜尖形:中
 蔴莢老化:快
 蔴莢仁熟(熟): 15~16
 穗仁配列:密
 穗毛重(公克): 6.70
 穗毛結莢高度(公分): 11.61
 莖梗脫離性:易



95A06422



95A06422





95A06423



95A06423




暫時碼: 95A06423
品種(系)名稱(英文): PI 291139
種子長(公厘): 7.33
種子寬(公厘): 5.91
種子厚(公厘): 4.23
種子形狀: 棒形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 淡褐
種臍環色: 茶褐色
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 10.74
幼莢莢長度(公分): 3.20
主莢莢間距(公分): 1.25
主莖粗細(公分): 0.98
莖色: 深綠
分枝性: 強
分枝密度: 開張
纏繞性: 強
小葉長(公分): 10.00
小葉寬(公分): 7.90
小葉形狀: 扇形
葉色: 深綠
托葉長短(公厘): 13.57
桿型: 半倚半吊型
採收: 稚大莢叢
種子色數: 紅少
播種至開花日數(天): 97
開花至嫩莢採收日數(天): 4
第一花序著生節位(節): 1
每一花序花數(朵): 2~3
花色: 黃
每花序著黃數(朵): 1~2
莢長(公分): 17.50
莢寬(公分): 0.84
莢厚(公分): 0.73
嫩莢彎曲度: 稍曲
嫩莢表面: 粗相細
嫩莢橫斷面: 極平
嫩莢軟硬: 硬硬
嫩莢新鮮: 有
嫩莢蟲害: 多
嫩莢肉質: 肉鬆
嫩莢肉厚(公厘): 0.72
嫩莢色澤: 淺綠
莢尖色素: 少
莢尖形: 中
嫩莢老化: 快
嫩莢種仁數(粒): 15~16
種仁配列: 單
單莢重(公克): 6.8
最高結莢厚度(公分): 8.70
莢梗脫離性: 易

暫時碼: 95A06570
品種(系)名稱(英文): PI 307561
種子長(公厘): 10.43
種子寬(公厘): 7.48
種子厚(公厘): 5.46
種子形狀: 棒圓形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 白
種臍環色: 其他
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 21.59
幼莢莢長度(公分): 3.29
主莢莢間距(公分): 1.90
主莖粗細(公分): 0.83
莖色: 黑
分枝性: 強
分枝密度: 直立
纏繞性: 強
小葉長(公分): 11.40
小葉寬(公分): 8.35
小葉形狀: 扇形
葉色: 深綠
托葉長短(公厘): 13.58
桿型: 半倚型
採收: 普通
種子色數: 少
播種至開花日數(天): 93
開花至嫩莢採收日數(天): 8
第一花序著生節位(節): 2
每一花序花數(朵): 2~3
花色: 白
每花序著黃數(朵): 2~3
莢長(公分): 20.20
莢寬(公分): 0.83
莢厚(公分): 0.77
嫩莢彎曲度: 稍曲
嫩莢表面: 粗相細
嫩莢橫斷面: 極平
嫩莢軟硬: 硬硬
嫩莢新鮮: 有
嫩莢蟲害: 多
嫩莢肉質: 肉鬆
嫩莢肉厚(公厘): 1.72
嫩莢色澤: 淺綠
莢尖色素: 多
莢尖形: 尖
嫩莢老化: 快
嫩莢種仁數(粒): 10~11
種仁配列: 單
單莢重(公克): 14.90
最高結莢厚度(公分): 16.40
莢梗脫離性: 易




95A06570



95A06570





95A06914



郵件號: 95A06914
產種(系)名稱(英文): PI 269666
[ACC6820]


種子長(公厘): 7.77
種子寬(公厘): 6.69
種子形狀: 菱形
種皮斑紋: 無
種皮底色: 綠
種橫環色: 深褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 15.56
幼莢莖軸長(公分): 3.20
主莖節間長短(公分): 1.60
主莖粗細(公分): 1.61
葉色: 綠
分枝性: 中
分枝著生性: 直立
纖維性: 強
小葉長(公分): 10.40
小葉寬(公分): 8.00
小葉形狀: 鞍形
葉色: 綠
托葉長短(公厘): 13.26
株型: 半有莖型
株勢: 直
植株色調: 暗少
播種至開花日數(天): 97
開花至嫩莢採收日數(天): 10
第一花序著生節位(朵): 6
每一花序著生數(朵): 2~3
花色: 淡紫紅
每花序著生數(朵): 2
莢長(公分): 17.50
莢寬(公分): 0.78
莢厚(公分): 0.66
嫩莢彎曲度: 曲
嫩莢表面: 平滑
嫩莢橫斷面: 橢圓
嫩莢縱斷面: 扁圓
嫩莢肉質: 嫩
嫩莢肉質: 多
嫩莢肉質: 浆糊
嫩莢肉厚(公厘): 3.79
嫩莢色澤: 淺
莢尖色調: 多
莢尖形: 尖
每莢種仁數(粒): 11~12
種仁剖面: 圓
單莢重(公克): 7.80
最高結莢厚度(公分): 22.65
莢梗脫離性: 易

郵件號: 97A05077
種子長(公厘): 10.5
種子寬(公厘): 4.88
種子厚(公厘): 3.96
種子形狀: 菱形
種皮斑紋: 有
種皮底色: 紅褐色
種皮切紋(點)色: 黑
種皮邊色: 暗褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 16.00
幼莢莖軸長(公分): 短
主莖節間長短(公分): 中
主莖粗細(公分): 中
葉色: 綠
分枝性: 中
小葉長(公分): 10.30
小葉寬(公分): 8.50
小葉形狀: 鞍形
葉色: 綠
枚形: 半有莖型
株勢: 直
葉綠色素: 中
重播至開花日數(天): 67
開花至嫩莢採收日數(天): 9
第一花序著生節位(朵): 2
每花序著生數(朵): 2~3
花色: 白
嫩莢花序著生數(朵): 2~3
莢長(公分): 36.00
莢寬(公分): 0.92
莢厚(公分): 1.11
嫩莢彎曲度: 弯曲
嫩莢表面: 平滑
嫩莢橫斷面: 圓
嫩莢肉質: 中
嫩莢肉厚(公厘): 中
嫩莢色澤: 淡紅或深紅
嫩莢色素: 中
莢尖形: 中
嫩莢老化: 嫩
最高莢厚度(公分): 11
種仁剖面: 圓
單莢重(公克): 11.80
最高結莢厚度(公分): 85.00
莢梗脫離性: 易




97A05077





2011A00211




標誌碼: 2011A00211
 品種(系)名稱(英文): PI 307554
 種子長(公厘): 11.61
 種子寬(公厘): 5.48
 種子厚(公厘): 4.93
 種子形狀: 菱形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 紅
 種皮斑紋或點色: 紅
 種皮底色: 紅
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 18.94
 主莢節間距(公分): 2.60
 莖色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝習性: 葬匍
 雜交性: 強
 小葉長(公分): 10.90
 小葉寬(公分): 6.00
 小葉形狀: 葵狀披針形
 黑色: 無
 休眠: 無
 着色: 有
 繩索: 有
 繩索色素: 無
 產種至開花日數(天): 45
 開花至收穫日數(天): 12
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(朵): 2~3
 莖長(公分): 65.10
 莖寬(公分): 0.91
 莖厚(公分): 0.88
 繩索弯曲度: 弧曲
 繩索直面: 平滑
 繩索橫斷面: 圓
 繩索肉質: 中
 繩索魚鱗狀: 有
 繩索尖刺: 無
 莖尖形: 尖
 莖老熟化: 中
 雄蕊總仁數(粒): 17
 雄蕊配列: 齒
 莖莢重(公克): 36.95
 莖莢結莢高度(公分): 15.50
 莖莢脫離性: 易

標誌碼: 00A00498
 品種(系)名稱(中文): 青皮黑仁
 種子長(公厘): 11.16
 種子寬(公厘): 5.00
 種子厚(公厘): 4.15
 種子形狀: 菱形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 黑
 種皮底色: 嫩黃
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 15.74
 主莢節間距(公分): 2.70
 莖色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝習性: 葬匍
 雜交性: 強
 小葉長(公分): 15.10
 小葉寬(公分): 8.50
 小葉形狀: 披針形
 黑色: 無
 休眠: 無限型
 着色: 黃綠
 繩索色素: 無
 產種至開花日數(天): 35
 開花至收穫日數(天): 12
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(朵): 2~3
 莖長(公分): 39.60
 莖寬(公分): 0.65
 莖厚(公分): 0.87
 繩索弯曲度: 曲
 繩索表面: 平滑
 繩索橫斷面: 圓
 繩索肉質: 嚥密
 繩索黃澤: 淡綠
 繩索魚鱗狀: 多
 莖尖形: 尖
 繩索老熟化: 快
 雄蕊總仁數(粒): 19
 雄蕊配列: 中
 莖莢重(公克): 20.15
 莖莢結莢高度(公分): 20.50
 莖莢脫離性: 易



00A00498






00A00503




標誌碼: 00A00503
品種(系)名稱(中文):豇豆3號
種子長(公厘): 12.27
種子寬(公厘): 6.83
種子厚(公厘): 4.72
種子形狀: 菜梗形
種皮斑紋: 有
種皮底色: 紅褐
種皮斑紋(點)色: 紅褐
種皮澤色: 暗褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 20.20
主莢節間長度(公分): 2.70
莢色: 淡綠
分枝性: 弱
分枝適性: 高
雄蕊性: 強
小葉長(公分): 14.10
小葉寬(公分): 7.00
小葉形狀: 近圓形
葉色: 綠
株型: 無莖型
株勢: 直插
植株色素: 無
播種至開花日數(天): 27
開花至嫩莢採收日數(天): 8
第一花序著生節位(節): 6
每一花序著生數(朵): 3~4
花色: 淡紫紅
每花序著生數(朵): 2~3
莢長(公分): 55.30
莢寬(公分): 0.71
莢厚(公分): 0.93
嫩莢帶曲度: 曲
嫩莢表面: 輕粗糙
嫩莢斷面: 雞冠
嫩莢肉質: 嫩密
嫩莢色澤: 淡綠
莢尖形: 中
嫩莢老化快
每莢播仁數(粒): 14
種仁配列: 中
單莢重(公克): 28.72
最低結莢高(公分): 15.50
莢裡脫離性: 弱

標誌碼: 00A00505
品種(系)名稱(中文):豇豆23號
種子長(公厘): 12.17
種子寬(公厘): 5.70
種子厚(公厘): 3.66
種子形狀: 菜梗形
種皮斑紋: 有
種皮底色: 紅褐
種皮斑紋(點)色: 紅褐
種皮澤色: 暗褐
種子表面: 平滑
吉拉種子重(公克): 19.66
主莢節間長度(公分): 12.20
莢色: 淡綠
分枝性: 中
分枝適性: 高
雄蕊性: 強
小葉長(公分): 14.60
小葉寬(公分): 8.40
小葉形狀: 菜狀披針形
葉色: 綠
株型: 無莖型
株勢: 直插
植株色素: 無
播種至開花日數(天): 39
開花至嫩莢採收日數(天): 10
第一花序著生節位(節): 4
每一花序著生數(朵): 2~3
花色: 淡紫紅
每花序著生數(朵): 2~3
莢長(公分): 53.70
莢寬(公分): 0.81
莢厚(公分): 1.09
嫩莢帶曲度: 弧曲
嫩莢表面: 平滑
嫩莢斷面: 雞冠
嫩莢肉質: 嫩密
嫩莢色澤: 淡綠



00A00505






00A00521




鑑評碼: 00A00521
 品種(系)名稱(中文): 大陸種豇豆
 種子長(公厘): 12.02
 種子寬(公厘): 5.59
 種子厚(公厘): 4.54
 種子形狀: 扇圓形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 褐
 種皮斑紋(點)色: 褐褐
 種皮暗色: 褐褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 17.68
 主莢節間長度(公分): 9.70
 莖色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝習性: 斜側
 蔊縮性: 強
 小葉面積(公分²): 18.00
 小葉寬(公分): 11.30
 小葉形狀: 扇狀披針形
 葉色: 綠
 葉型: 無羽型
 葉脉: 細脈
 楊葉色: 黃
 播種至開花日數(天): 60
 開花至嫩莢採收日數(天): 14
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 5~6
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(朵): 2~3
 畸異(公分): 50.10
 黃葉(公分): 1.08
 黃瘦(公分): 1.49
 黃黃骨質曲形: 直曲
 黃黃肉質直
 黃黃橫裂直: 平
 黃黃肉質: 圓
 黃黃色澤: 深紅或紫黑
 苞尖色: 少
 苞尖形: 中
 黑黃老仁: 有
 每莢種仁數(粒): 14
 種仁剖面: 旗
 莖葉面積(公分²): 45.30
 最低結莢厚度(公分): 16.00
 炎梗脫離性: 強

鑑評碼: 00A00527
 品種(系)名稱(中文): 林內花皮豆
 種子長(公厘): 12.02
 種子寬(公厘): 5.59
 種子厚(公厘): 4.54
 種子形狀: 扇圓形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 紅褐
 種皮斑紋(點)色: 紅褐
 種皮暗色: 紅褐
 種子表面: 中
 吉粒種子重(公克): 16.42
 主莢節間長度(公分): 9.70
 莖色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝習性: 斜側
 蔊縮性: 強
 小葉面積(公分²): 18.00
 小葉寬(公分): 11.30
 小葉形狀: 扇狀披針形
 葉色: 綠
 葉型: 無羽型
 葉脉: 細脈
 楊葉色: 紅
 播種至開花日數(天): 60
 開花至嫩莢採收日數(天): 14
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 5~6
 花色: 淡紫紅
 每花序著花數(朵): 2~3
 畸異(公分): 45.60
 黃葉(公分): 0.92
 黃瘦(公分): 1.47
 黃黃骨質曲形: 弯曲
 黃黃肉質圓
 黃黃橫裂直: 圓
 黃黃肉質: 圓
 黃黃色澤: 深紅或紫黑
 苞尖色: 中
 苞尖形: 中
 黑黃老仁: 快
 每莢種仁數(粒): 8
 種仁剖面: 旗
 莖葉面積(公分²): 40.03
 最低結莢厚度(公分): 10.00
 炎梗脫離性: 強



00A00527





00A00529



鑑定號: 00A00529
 品種(系)名稱(中文): 滷州紅豆
 品種(系)名稱(英文)
 種子長(公厘): 11.35
 種子寬(公厘): 6.51
 種子厚(公厘): 3.65
 種子形狀: 長圓形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 紅褐
 種皮頂紋(點)色: 紅褐
 種皮澤度: 滑澤
 種子表面: 雜錯
 百粒種子重(公克): 15.66
 主莖節間長短(公分): 1.20
 葉色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝密度: 密
 蔥綠性: 強
 小葉長(公分): 15.80
 小葉寬(公分): 8.80
 小葉形狀: 瓣狀披針形
 葉色: 綠
 佛焰苞型: 無
 枝勢: 粗大挺直
 猩桃色: 有
 播種至開花日數(天): 68
 開花至始收穫日數(天): 8
 第一花序著生節位(節): 7
 第一花序花數(朵): 5~6
 花色: 淡紫紅
 雄花序著生節位(節): 3~4
 黃黃(公分): 25.60
 黃寬(公分): 1.00
 黃厚(公分): 0.88
 細黃瓣曲度: 弧曲
 細黃表面: 粗糙
 細黃瓣斷面: 橢圓
 細黃肉質: 滑澤
 細黃色澤: 淡綠
 黑尖色素: 無
 黃尖形: 中
 黃莢老化: 快
 黃莢仁寬(公厘): 14
 種仁配列: 直
 種莢重(公克): 12.14
 番紅桔黃高粱(公分): 19.00
 黃梗根雌性: 無


鑑定號: 00A01188
 種子長(公厘): 10.80
 種子寬(公厘): 5.26
 種子厚(公厘): 1.67
 種子形狀: 平闊形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 淡褐
 種皮頂紋(點)色: 淡褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 11.50
 幼苗莢綠長(公分): 短
 主莖節間長(公分): 長
 主莖粗細(公分): 中
 葉色: 綠
 分枝性: 弱
 小葉長(公分): 6.30
 小葉寬(公分): 3.00
 小葉形狀: 絲圓形
 葉色: 淺綠
 佛焰苞型: 無
 枝勢: 強
 猩桃色: 中
 藥莢至開花日數(天): 36
 開花至始收穫日數(天): 12
 第一花序著生節位(節): 7
 第一花序花數(朵): 2~4
 花色: 紫
 雄花序著生節位(節): 2~4
 黃西(公分): 33.20
 黃寬(公分): 0.58
 黃厚(公分): 0.60
 細黃瓣曲度: 直
 細黃表面: 平滑
 細黃橫斷面: 圓
 細黃肉質: 滑澤
 細黃肉厚(公厘): 中
 細黃色澤: 特
 黃尖色素: 多
 黃尖形: 尖
 黃莢老化: 慢
 種莢種仁寬(公厘): 9
 種仁配列: 斜
 種莢重(公克): 6.16
 番紅桔黃高粱(公分): 62.00
 黃梗根雌性: 無

00A01188






00A01190




編號碼: 00A01190
 穗子長(公厘): 10.59
 穗子寬(公厘): 4.62
 穗子厚(公厘): 4.46
 穗子形狀: 莖莢形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 深
 穗頭頂色: 無
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 10.50
 幼莢胚軸細(公分): 短
 主莢節間長短(公分): 中
 主莢粗細(公分): 中
 莖色: 深綠
 分枝性: 弱
 小葉長(公分): 7.50
 小葉寬(公分): 4.70
 小葉形狀: 扇狀披針形
 葉色: 深綠
 葉型: 扇圓型
 葉勢: 直
 葉緣: 全緣
 葉緣色素: 中
 撫種至開花日數(天): 37
 開花至摘莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 11
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 其他
 每花序著葉數(葉): 2~4
 黃葉(公分): 34.00
 黃葉(公分): 0.69
 紫葉(公分): 0.73
 紫黃端曲度: 直
 紫黃表皮: 平滑
 紫黃橫斷面: 圓
 紫黃肉質: 密
 紫黃肉厚(公厘): 淺
 紫黃色澤: 深
 莖尖形: 尖
 紫黃老化: 嫩
 每莢種仁數(粒): 16
 種仁剖面: 細
 菜莢重(公克): 13.17
 最低結莢英厚度(公分): 50.00
 黃便能耐性: 強



編號碼: 00A01194
 穗子長(公厘): 11.55
 穗子寬(公厘): 5.50
 穗子厚(公厘): 4.63
 穗子形狀: 莖莢形
 穗皮斑紋: 有
 穗皮底色: 白
 穗皮切紋(點)色: 淡褐
 穗頭頂色: 茶褐色
 穗子表面: 中
 百粒穗子重(公克): 15.20
 幼莢胚軸細(公分): 短
 主莢節間長短(公分): 中
 主莢粗細(公分): 中
 莖色: 深綠
 分枝性: 弱
 小葉長(公分): 6.80
 小葉寬(公分): 4.80
 小葉形狀: 扇圓形
 葉色: 深綠
 葉型: 扇圓型
 葉勢: 直
 葉緣色素: 少
 撫種至開花日數(天): 33
 開花至嫩莢採收日數(天): 12
 第一花序著生節位(節): 9
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 其他
 每花序著葉數(葉): 2~4
 黃葉(公分): 57.00
 黃葉(公分): 0.70
 紫葉(公分): 0.70
 紫黃端曲度: 直
 紫黃表皮: 平滑
 紫黃橫斷面: 圓
 紫黃肉質: 密
 紫黃肉厚(公厘): 厚
 紫黃色澤: 深綠
 莖尖形: 尖
 紫黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 19
 種仁剖面: 中
 菜莢重(公克): 21.02
 最低結莢英厚度(公分): 80.00
 黃便能耐性: 強

00A01194





00A01196




郵局碼: 00A01196
 英文(系)名稱(英文): VN89CK5128
 種子長(公厘): 11.20
 種子寬(公厘): 5.71
 種子厚(公厘): 4.42
 種子形狀: 胸鏡形
 種皮斑紋: 有
 種皮花色: 紅褐
 種皮斑紋(點)色: 紅褐
 種皮暗色: 暗褐
 種子表面: 中
 白粒種子數(公克): 17.96
 主莢節間長度(公分): 4.60
 莖色: 淡綠
 分枝性: 弱
 分枝個數: 斜側
 葉緣性: 強
 小葉長(公分): 12.00
 小葉寬(公分): 7.10
 小葉形狀: 扇狀披針形
 葉色: 綠
 葉型: 無羽型
 穗勢: 強
 穗色: 黑
 播種至開花日數(天): 60
 開花至嫩莢採收日數(天): 8
 第一花序著生節位(節): 6
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 2~3
 粒重(公分): 76.60
 黃寬(公分): 0.88
 黃瘦(公分): 0.94
 黃黃骨圓曲直: 弯曲
 黃黃骨直: 平滑
 黃黃橫面直: 橫圓
 黃黃肉質: 中
 黃黃薄肉淡薄
 黃尖色: 黑
 黃尖形: 中
 黃黃老花: 中
 每莢種仁數(粒): 21
 種仁配列: 中
 單莢重(公克): 40.43
 最低結莢密度(公分): 21.00
 美梗脫離性: 有




00A03529



郵局碼: 00A03529
 種子長(公厘): 9.94
 種子寬(公厘): 6.40
 種子厚(公厘): 5.25
 種子形狀: 胸鏡形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 紅褐
 種皮斑紋(點)色: 紅褐
 種皮暗色: 暗褐
 種子表面: 平滑
 白粒種子數(公克): 16.28
 主莢節間長度(公分): 2.80
 莖色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝個數: 密
 葉緣性: 強
 小葉長(公分): 14.30
 小葉寬(公分): 8.00
 小葉形狀: 簇狀披針形
 葉色: 綠
 穗型: 扇形
 穗勢: 強
 穗色: 黑
 播種至開花日數(天): 51
 開花至嫩莢採收日數(天): 12
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 3~4
 粒重(公克): 25.50
 黃寬(公分): 0.74
 黃瘦(公分): 0.79
 黃黃骨圓曲直: 直
 黃黃老花: 平滑
 黃黃橫面直: 圓
 黃黃肉質: 橫密
 黃黃色澤: 淡紅或紫紅
 黃黃素組: 純
 黃尖形: 中
 黃黃老花: 中
 每莢種仁數(粒): 15
 種仁配列: 中
 單莢重(公克): 11.86
 最低結莢密度(公分): 10.00
 美梗脫離性: 強



00A03531



編號碼: 00A03531
 種子長(公厘): 9.02
 種子寬(公厘): 6.43
 種子厚(公厘): 4.67
 種子形狀: 腋圓形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 深褐
 種皮底紋: 黃色紅褐色
 種臍環色: 指褐色
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 14.98
 主莢節間距(公分): 9.10
 葉色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝習性: 簡單
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 12.30
 小葉寬(公分): 8.20
 小葉形狀: 長狀披針形
 葉緣: 齒
 穗型: 無莖型
 穗勢: 直通
 穗柱色素: 無
 播種至開花日數(天): 48
 開花至始黃採收日數(天): 8
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序子數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 花序序著黃數(個): 2~3
 莖長(公分): 23.60
 莖寬(公分): 0.95
 莖厚(公分): 0.93
 莖葉彎曲度: 直
 莖葉黃綠色: 細長
 莖葉黃綠色: 細短
 莖葉黃綠色: 細圓
 莖葉肉質: 嚙密
 莖葉黃色: 深綠
 莖葉色素: 無
 莖尖形: 尖
 莖黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 18
 種仁配列: 雜
 莖莢重(公克): 12.38
 番荔枝莢黃高(公分): 15.00
 莖梗脫離性: 有

編號碼: 00A03532
 種子長(公厘): 9.42
 種子寬(公厘): 5.40
 種子厚(公厘): 5.30
 種子形狀: 腋圓形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 紅褐色
 種皮底紋: 黃色紅褐色
 種臍環色: 深褐色
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 14.44
 主莢節間距(公分): 1.70
 葉色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝習性: 簡單
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 12.80
 小葉寬(公分): 7.40
 小葉形狀: 長狀披針形
 葉緣: 齒
 穗型: 無莖型
 穗勢: 直通
 穗柱色素: 無
 播種至開花日數(天): 63
 開花至始黃採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 6
 每一花序子數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 花序序著黃數(個): 2~3
 莖長(公分): 20.50
 莖寬(公分): 0.84
 莖厚(公分): 0.88
 莖葉彎曲度: 略曲
 莖葉黃綠色: 平滑
 莖葉橫斷面: 穩圓
 莖葉肉質: 嚙密
 莖葉黃色: 深綠
 莖葉色素: 無
 莖尖形: 中
 莖黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 15
 種仁配列: 中
 莖莢重(公克): 8.63
 番荔枝莢黃高(公分): 27.00
 莖梗脫離性: 有

00A03532





鑑評碼: 00A03533
 櫛子長(公厘): 9.18
 櫛子寬(公厘): 4.43
 櫛子厚(公厘): 4.28
 櫛子形狀: 葵輪形
 櫛皮斑紋: 有
 櫛皮藍色: 藍綠
 櫛皮斑紋(點)色: 紅褐
 櫛納環色: 紅褐
 櫛子直度: 平滑
 百粒櫛子重(公克): 15.44
 主莖節間長(短)公分): 4.60
 莖色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝葉性: 半開
 雄蕊性: 強
 小葉長(公分): 12.10
 小葉寬(公分): 9.20
 小葉形狀: 蔭狀披針形
 莖色: 綠
 櫛型: 無頭型
 櫛株: 直播
 櫛株色: 黃
 櫛種至開花日數(天): 49
 開花至嫩莢採收日數(天): 12
 第一花序產生節位(節): 8
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 每花序著果數(朵): 2~3
 莖長(公分): 19.30
 莖寬(公分): 0.87
 莖厚(公分): 0.95
 櫛黃瓣曲度: 直曲
 櫛黃老直度: 平滑
 櫛黃橫斷面: 圓圓
 櫛莢肉質: 嚙密
 櫛黃色澤: 淡綠
 櫛尖色澤: 黃
 櫛尖形: 尖
 櫛葉老化: 中
 櫛黃種仁數(粒): 11
 櫛仁配列: 差
 莖莢重(公克): 9.11
 蕁低結莢厚度(公分): 20.00
 莖梗脫離性: 易

00A03533




鑑評碼: 02A00119
 櫛子長(公厘): 11.65
 櫛子寬(公厘): 5.89
 櫛子厚(公厘): 4.91
 櫛子形狀: 葵輪形
 櫛皮斑紋: 有
 櫛皮底色: 紅褐
 櫛皮斑紋(點)色: 紅褐
 櫛納環色: 紅褐
 櫛子直度: 平滑
 百粒櫛子重(公克): 20.81
 主莖節間長(短)公分): 5.60
 莖色: 淡綠
 分枝性: 弱
 分枝葉性: 密
 雄蕊性: 強
 小葉長(公分): 11.50
 小葉寬(公分): 7.10
 小葉形狀: 蔭狀披針形
 莖色: 淡綠
 櫛型: 無頭型
 櫛株: 直
 櫛株色: 黃
 櫛種至開花日數(天): 23
 開花至嫩莢採收日數(天): 8
 第一花序產生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 每花序著果數(朵): 2~3
 莖長(公分): 72.20
 莖寬(公分): 0.96
 莖厚(公分): 0.96
 櫛黃瓣曲度: 直
 櫛黃老直度: 平滑
 櫛黃橫斷面: 圓
 櫛莢肉質: 嚙密
 櫛黃色澤: 淡綠
 櫛尖色澤: 中
 櫛尖形: 尖
 櫛葉老化: 中
 櫛黃種仁數(粒): 20
 櫛仁配列: 差
 莖莢重(公克): 49.63
 蕁低結莢厚度(公分): 14.50
 莖梗脫離性: 易




02A00119



Vigna unguiculata (L.) Walp. Germplasm Illustrations

02A00120




編號: 02A00120
 種子長(公厘): 13.04
 種子寬(公厘): 7.02
 種子厚(公厘): 4.24
 種子形狀: 葫蘆形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 深
 種皮斑紋(點)色: 暗褐
 種臍環色: 暗褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 19.08
 主莖節間長短(公分): 16.50
 葉色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝習性: 斜匍
 繩索性: 強
 小葉長(公分): 11.60
 小葉寬(公分): 8.20
 小葉形狀: 扇狀披針形
 葉色: 綠
 條型: 無突起
 條勢: 直
 條幅: 無
 播種至開花日數(天): 22
 開花至始採收日數(天): 4
 第一花序著生節位(節): 2
 每一花序著生數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 莖花序著生數(朵): 1~2
 莖長(公分): 47.20
 莖寬(公分): 0.54
 莖厚(公分): 0.44
 莖頂葉曲度: 直
 莖黃老色: 無
 莖黃老色: 稍有
 莖黃老色: 無
 莖黃色澤: 淡綠
 莖尖色澤: 中
 莖尖形: 中
 莖黃老化: 強
 每莖種仁數(粒): 17
 種仁配列: 雜
 單莢重(公克): 6.18
 蕈低結莢莢重(公分): 8.40
 莖梗脫離易

編號: 02A00121
 種子長(公厘): 11.20
 種子寬(公厘): 5.86
 種子厚(公厘): 4.42
 種子形狀: 葫蘆形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 黑
 種皮斑紋(點)色: 黑
 種臍環色: 暗褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 19.30
 主莖節間長短(公分): 5.70
 葉色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝習性: 斜匍
 繩索性: 中
 小葉長(公分): 6.80
 小葉寬(公分): 3.80
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 淡綠
 條型: 扇形
 條勢: 細弱
 條幅: 無
 播種至開花日數(天): 25
 開花至始採收日數(天): 6
 第一花序著生節位(節): 2
 每一花序著生數(朵): 3~4
 花色: 淡紫紅
 莖花序著生數(朵): 1~2
 莖長(公分): 60.80
 莖寬(公分): 0.84
 莖厚(公分): 0.69
 莖頂葉曲度: 曲
 莖黃老色: 平滑
 莖黃老色: 圓
 莖黃肉質: 柔密
 莖黃色澤: 淡綠
 莖尖色澤: 少
 莖尖形: 中
 莖黃老化: 弱
 每莖種仁數(粒): 13
 種仁配列: 雜
 單莢重(公克): 28.36
 蕈低結莢莢重(公分): 19.50
 莖梗脫離難



02A00121






03A01188



03A01188

編號: 03A01188
品種(系)名稱(英文): TV04011
種子長(公厘): 11.28
種子寬(公厘): 5.48
種子厚(公厘): 3.98
種子形狀: 菱圓形
種皮斑紋: 有
種皮花色: 綠
種皮斑紋(點)色: 暗褐
種臍環色: 暗褐
種子表面: 平滑
百粒種子重(公克): 18.57
幼莢莖軸粗(公分): 3.29
主莢莖間距(公分): 1.35
主莢粗細(公分): 0.77
葉色: 淡綠
分枝性: 中
分枝習性: 蔓匍
連續性: 強
小葉長(公分): 10.65
小葉寬(公分): 7.45
小葉形狀: 菱形
葉色: 綠
托葉長短(公厘): 13.67
株型: 半直半攀型
株勢: 直
植株色系: 無
播種至開花日數(天): 92
開花至始收日數(天): 9
第一花序著生節位(節): 2
每一花序花數(朵): 3~4
花色: 白
每花序著花數(英): 2~3
莢長(公分): 26.20
莢寬(公分): 0.71
莢厚(公分): 0.90
嫩莢弯曲度: 稍曲
嫩莢表面: 光滑
嫩莢橫斷面: 圓
嫩莢軟硬: 硬軟
嫩莢結構: 有
嫩莢肉質: 少
嫩莢肉質變密
嫩莢肉厚(公厘): 3.31
嫩莢色澤: 淡黃
莢尖色澤: 黃
莢尖形: 扁
嫩莢老化: 中
嫩莢種仁數(粒): 13
種仁配列: 中
單莢重(公克): 22.00
最短莢長(公分): 21.00
莢梗強健性: 強



03A01189



03A01189

編號: 03A01189
品種(系)名稱(英文): TV04012
種子長(公厘): 11.04
種子寬(公厘): 6.36
種子厚(公厘): 4.27
種子形狀: 菱圓形
種皮斑紋: 有
種皮花色: 綠
種皮斑紋(點)色: 紅褐
種臍環色: 淡褐
種子表面: 中
百粒種子重(公克): 17.10
幼莢莖軸粗(公分): 3.21
主莢莖間距(公分): 2.35
主莢粗細(公分): 0.74
葉色: 淡綠
分枝性: 強
分枝習性: 蔓匍
連續性: 中
小葉長(公分): 10.65
小葉寬(公分): 7.80
小葉形狀: 菱形
葉色: 綠
托葉長短(公厘): 13.71
株型: 半直半攀型
株勢: 直大旺盛
植株色系: 無
播種至開花日數(天): 92
開花至始收日數(天): 9
第一花序著生節位(節): 1
每一花序花數(朵): 3~4
花色: 白
每花序著花數(英): 2~3
莢長(公分): 29.15
莢寬(公分): 0.82
莢厚(公分): 0.84
嫩莢弯曲度: 稍曲
嫩莢表面: 光滑
嫩莢橫斷面: 圓
嫩莢軟硬: 硬硬
嫩莢結構: 有
嫩莢肉質: 少
嫩莢肉質變密
嫩莢肉厚(公厘): 2.36
嫩莢色澤: 淡黃
莢尖色澤: 淡綠
莢尖形: 中
嫩莢老化: 中
嫩莢種仁數(粒): 12~13
種仁配列: 中
單莢重(公克): 14.10
最短莢長(公分): 17.55
莢梗強健性: 易
莢梗脆軟性: 易



03A01190



03A01190



郵件號: 03A01190
 品種(系)名稱(英)或中文名稱(中文): TV04034
 種子長(公厘): 10.59
 種子寬(公厘): 6.20
 種子厚(公厘): 4.54
 種子形狀: 扁圓形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 黃
 種皮斑紋(顏色): 紅褐
 種皮澤度: 滑潤
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 18.43
 幼苗莖葉總長(公分): 3.10
 主莖莖葉總長(公分): 3.00
 主莖粗細(公分): 0.71
 葉色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝密性: 開展
 繩繕性: 中
 小葉長(公分): 10.75
 小葉寬(公分): 8.20
 小葉形狀: 雞形
 葉色: 滑綠
 托葉長短(公厘): 13.83
 檍型: 無斑型
 檍株: 大莖莖
 檍株色: 綠
 撫種至開花日數(天): 91
 開花至莢果採收日數(天): 9
 第一花序座生花節(節): 2
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 白
 每花序著黃數(莢): 2~3
 黃數(公分): 26.95
 黃寬(公分): 0.86
 黃厚(公分): 0.88
 黃黃弯曲度: 曲
 黃黃表面: 光滑
 黃黃橫面: 扁平
 黃黃軟硬: 堅硬
 黃黃結實: 好
 黃黃堆疊: 多
 黃黃肉質: 中
 黃黃肉厚(公厘): 2.47
 黃黃色澤: 深紅或紫黑
 黃黃色調: 多
 黃尖形: 鋒
 黃黃老化: 弱
 每株種仁數(粒): 12~13
 種仁配列: 中
 種莢重(公克): 11.60
 種莢結莢厚度(公分): 18.20
 黃莢脫殼性: 弱


原單位: 04A00110
 品種(系)名稱(中文): 冬瓜豆
 種子長(公厘): 11.42
 種子寬(公厘): 5.51
 種子厚(公厘): 3.88
 種子形狀: 扁圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 黃
 種皮澤度: 滑
 種子表面: 糙
 百粒種子重(公克): 14.13
 幼苗莖葉總長(公分): 2.65
 主莖莖葉總長(公分): 4.6
 主莖粗細(公分): 0.53
 葉色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝密性: 密
 繩繕性: 強
 小葉長(公分): 11.1
 小葉寬(公分): 7.15
 小葉形狀: 長橢圓狀或針形
 葉色: 綠
 托葉長短(公厘): 12.35
 檍莖無斑型
 檍莖直
 檍株色: 綠少
 撫種至開花日數(天): 76
 開花至莢果采收日數(天): 18
 第一花序座生花節(節): 3
 每一花序花數(朵): 2
 花色: 淡紫紅
 黃數(公分): 44.8
 黃寬(公分): 0.84
 黃厚(公分): 1.00
 黃黃弯曲度: 直
 黃黃表面: 光滑
 黃黃橫斷面: 圓圓
 黃黃軟硬: 柔軟
 黃黃筋絲: 有
 黃黃纖維: 中
 黃黃肉質: 濕密
 黃黃肉厚(公厘): 3.85
 黃黃色澤: 滑綠
 黃黃色素: 少
 黃尖形: 中
 黃黃老化: 中
 種仁數(粒): 14
 種仁配列: 中
 種莢重(公克): 26.8
 高溫結莢厚度(公分): 20.6
 黃莢樹雌性: 弱

04A00110



04A00110



Vigna unguiculata (L.) Walp. Germplasm Illustrations

04A00114



04A00114



原單位永久碼: 04A00114
 品種(系)名稱(中文): 長豇豆
 種子長(公厘): 10.99
 種子寬(公厘): 5.45
 種子厚(公厘): 3.95
 種子形狀: 腋瓣形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 淡黃
 種臍環色: 茶褐
 種子表面: 細緻
 百粒種子重(公克): 13.80
 幼莢胚軸長(公分): 2.44
 主莢莖間距離(公分): 8.85
 主莢粗細(公分): 0.55
 葉色: 淡綠
 分枝性: 弱
 分枝部位: 茎葉
 繩繫性: 強
 小葉寬(公分): 9.60
 小葉寬(公分): 6.95
 小葉形狀: 鋸形
 葉色: 綠
 托葉長短(公厘): 12.59
 檢型: 無瘤型
 檢勢: 強弱
 檢休色: 無
 檢種至開花日數(天): 89
 開花至莢果採收日數(天): 12
 第一花序著生節位(節): 2
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 白
 每花序著花數(朵): 2~3
 黃長(公分): 53.20
 黃寬(公分): 0.79
 黃厚(公分): 0.91
 黃莢橢圓度: 弧曲
 黃莢表面: 粗糙
 黃莢橫剖面: 呈平
 黃莢數: 散
 黃莢粒狀: 無
 黃莢纖維: 少
 黃莢肉質: 細密
 黃莢肉厚(公厘): 2.60
 黃莢薄厚(公厘): 2.60
 黃莢色澤: 淡綠
 黃莢素色: 少
 美尖形: 弱
 美老仁: 中
 每莢種仁數(粒): 13~14
 種仁配列: 中
 葉莢重(公克): 24.50
 最低結莢率(厚度公分): 16.15
 黃莢脫離性: 強

原路碼: 04A00192
 品種(系)名稱(英文): PI 175962
 種子長(公厘): 8.63
 種子寬(公厘): 6.62
 種子厚(公厘): 5.14
 種子形狀: 球形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 淡黃
 種臍環色: 茶褐
 種子表面: 細緻
 百粒種子重(公克): 16.37
 幼莢胚軸長(公分): 2.70
 主莢莖間距離(公分): 2.00
 主莢粗細(公分): 0.92
 葉色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝部位: 茎葉
 繩繫性: 強
 小葉寬(公分): 10.20
 小葉寬(公分): 9.30
 小葉形狀: 鋸形
 葉色: 淡綠
 托葉長短(公厘): 12.01
 檢型: 半凸圓型
 檢勢: 強
 檢休色: 細少
 檢種至開花日數(天): 83
 開花至莢果採收日數(天): 15
 第一花序著生節位(節): 3
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著花數(朵): 2~3
 黃長(公分): 16.40
 黃寬(公分): 0.77
 黃厚(公分): 0.72
 黃莢彎曲度: 直
 黃莢表面: 平滑
 黃莢橫剖面: 圓
 黃莢軟硬: 楊硬
 黃莢筋絲: 有
 黃莢纖維: 多
 黃莢肉質: 細密
 黃莢肉厚(公厘): 2.00
 黃莢色澤: 綠
 黃莢素色: 無
 美尖形: 強
 美老仁: 中
 每莢種仁數(粒): 11~12
 種仁配列: 強
 葉莢重(公克): 7.10
 最低結莢率(厚度公分): 20.45
 黃莢粗繩性: 強




04A00192




04A00192



04A00192



04A00193





鑑評碼: 04A00193
 品種(系)名稱(英文): PI 180013
 種子長(公厘): 7.26
 種子寬(公厘): 5.97
 種子厚(公厘): 4.61
 種子形狀(橢圓形)
 種皮斑紋: 無
 種皮花色: 緑
 種臍環色: 茶褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 13.42
 主莖節間長(公分): 2.50
 葉色: 淡綠
 分枝習性: 葉腋
 繼續性: 中
 小葉長(公分): 12.70
 小葉寬(公分): 11.50
 小葉形狀: 扇形
 葉色: 綠
 檢型: 扇狀型
 穎勢: 很大旺盛
 種株色素: 無
 播種至開花日數(天): 35
 開花至始黃採收日數(天): 7
 第一花序產生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 5~6
 花色: 淡紫紅
 花序序著葉數(葉): 1~2
 葉長(公分): 15.40
 葉寬(公分): 0.88
 葉厚(公分): 0.68
 葉黃弯曲度: 曲
 葉黃卷曲: 平滑
 葉黃彌蓋: 強烈
 黃葉肉質: 滑嫩
 黃色澤: 淺
 葉尖色: 無
 黃尖形: 宽
 黃葉老化: 有
 每莢種仁數(粒): 16
 種仁配列: 密
 種莢重(公克): 6.18
 最低結莢莢厚度(公分): 18.00
 黃便脫離性: 易

鑑評碼: 04A00196
 品種(系)名稱(英文): PI 298051
 種子長(公厘): 7.27
 種子寬(公厘): 4.98
 種子厚(公厘): 4.23
 種子形狀: 橢圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 淡黃
 種臍環色: 茶褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 10.92
 主莖節間長(公分): 1.60
 葉色: 淡綠
 分枝習性: 強
 分枝耐性: 直立
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 10.00
 小葉寬(公分): 7.20
 小葉形狀: 簇狀披針形
 葉色: 綠
 檢型: 扇形
 穎勢: 很強
 種株色素: 無
 播種至開花日數(天): 43
 開花至始黃採收日數(天): 11
 第一花序產生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 5~6
 花色: 淡紫紅
 花序序著葉數(葉): 2~3
 葉長(公分): 15.50
 葉寬(公分): 0.77
 葉厚(公分): 0.57
 葉黃弯曲度: 強曲
 葉黃卷曲: 強卷曲
 葉黃彌蓋: 強烈
 葉黃橫斷面: 圓平
 黃葉肉質: 中
 黃葉色澤: 淺綠
 黃尖色: 無
 黃尖形: 宽
 黃葉老化: 中
 最低結莢莢厚度(公分): 13
 種仁配列: 密
 種莢重(公克): 4.10
 最低結莢莢厚度(公分): 12.00
 黃便脫離性: 易



04A00196





04A00197




04A00197



鑑評號: 04A00197
 品種(系)名稱(英文): PI 307554
 穗子長(公厘): 12.07
 穗子寬(公厘): 6.25
 穗子厚(公厘): 4.33
 穗子形狀: 橢圓形
 穗莢斑紋: 無
 穗皮底色: 黃褐
 穗皮斑紋(裏)色: 掛褐
 穗鞘暗色: 茶褐色
 穗子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 17.34
 穗莢莖軸長(公分): 3.15
 主莢節間長(公分): 5.33
 主莢粗細(公分): 0.52
 葉色: 綠
 分枝性: 中
 分枝留葉性: 較弱
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 9.67
 小葉寬(公分): 6.44
 小葉形狀: 扇形
 葉色: 綠
 托葉長短(公厘): 10.55
 穗型: 無假莢
 穗勢: 無攝
 穗株色: 黑
 穗種莢花序日數(天): 82
 麥花至莢黃葉採收日數(天): 11
 第一花序著生節位(節): 2
 每一花序花數(朵): 3
 花色: 白
 每花序著花數(朵): 1~2
 黃長(公分): 50.9
 黃寬(公分): 0.68
 黃厚(公分): 0.79
 葉黃綠程度: 稍曲
 葉黃舌苔: 稍粗
 葉黃葉面溫
 葉莢較硬: 剪板硬
 葉莢扁平: 肥
 葉莢纖維: 中
 蔴莢肉質: 肥嫩
 蔴莢肉質(公克): 2.01
 蔴莢色澤: 深白
 黃尖色素: 中
 黃尖形: 尖
 蔴莢老化: 中
 每莢種仁數(粒): 12~13
 穗仁配列: 整
 穗莢重(公克): 18
 最低結莢高度(公分): 19.2
 莖莢脫離易: 易

鑑評號: 05A06350
 品種(系)名稱(英文): PI 173827
 穗子長(公厘): 7.07
 穗子寬(公厘): 6.20
 穗子厚(公厘): 4.70
 穗子形狀: 球形
 穗莢斑紋: 無
 穗皮底色: 黃
 穗皮斑紋色: 黃褐
 穗子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 13.62
 主莢節間長(公分): 2.70
 葉色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝留葉性: 弱
 繼續性: 強
 小葉長(公分): 14.00
 小葉寬(公分): 9.40
 小葉形狀: 卵形
 葉色: 綠
 穗型: 無限制
 穗勢: 直
 穗種莢花序數(朵): 2~3
 花色: 淡紫紅
 蒜花序著花數(天): 3~4
 黃長(公分): 14.70
 黃寬(公分): 0.87
 黃厚(公分): 0.69
 葉黃瓣曲度: 曲
 葉黃表面: 平滑
 葉黃橫斷面: 圓
 葉黃肉質: 柔軟
 葉黃色澤: 深
 莖尖色素: 無
 莖尖形: 中
 莖莢老化: 中
 每莢種仁數(粒): 15
 穗仁配列: 密
 穗莢重(公克): 6.28
 最低結莢高度(公分): 10.80
 莖莢脫離易: 易




05A06350





05A06351




鑑評碼: 05A06351
 畜種(系)名稱(英文): PI 175332
 種子長(公厘): 12.11
 種子寬(公厘): 5.69
 種子厚(公厘): 4.30
 種子形狀: 腎臟形
 種皮斑紋: 有
 種皮底色: 黑
 種皮近紅(點)色: 黑
 種皮綠色: 錫蘭
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 18.04
 主莢節間長短(公分): 5.4
 莖色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝葉性: 斜側
 護納性: 強
 小葉面積(公分²): 10.80
 小葉寬(公分): 4.90
 小葉形狀: 葵狀披針形
 莖色: 綠
 枝型: 無混型
 枝勢: 直
 枝條色: 黃
 撐穗至開花日數(天): 38
 開花至嫩莢採收日數(天): 15
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序芻數(節): 1~2
 花色: 白
 每花序著芻數(節): 2~3
 黃質(公分): 48.80
 黃寬(公分): 0.85
 黃厚(公分): 1.02
 黃莢總體度: 直
 黃莢直: 平滑
 黃莢橫面直: 直
 黃肉內質: 粗胞
 黃葉色澤: 深綠
 黃尖形: 有
 黃尖形: 好
 蔗萬老仁: 中
 每莢種仁數(粒): 19
 種仁配列: 齊
 單莢重(公克): 31.28
 單株莢重(公克): 15.50
 單株莢數: 易

鑑評碼: 05A06353
 種子長(公厘): 7.66
 種子寬(公厘): 5.39
 種子厚(公厘): 4.34
 種子形狀: 腎臟形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 白
 種皮暗色: 增褐
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 14.20
 幼莢粗細長(公分): 中
 主莢節間長短(公分): 短
 主莢粗細(公分): 中
 莖色: 綠
 分枝性: 中
 小葉面積(公分²): 6.30
 小葉寬(公分): 4.30
 小葉形狀: 披針形
 莖色: 綠
 枝型: 半直冠型
 枝勢: 直
 枝條色: 多
 莖葉至開花日數(天): 42
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序芻數(節): 2~3
 花色: 白
 每花序著芻數(節): 2~3
 黃質(公分): 14.00
 黃寬(公分): 0.78
 黃厚(公分): 0.64
 黃莢彎曲度: 弯曲
 黃莢表面形: 平滑
 黃莢橫斷面: 圓圓
 黃莢肉質: 濃密
 黃莢肉厚(公厘): 中
 黃葉色澤: 淡
 黃尖形: 多
 黃尖形: 尖
 黃莢老化: 中
 每莢種仁數(粒): 12
 種仁配列: 密
 單莢重(公克): 5.23
 單株莢重(公克): 32.00
 單株莢數: 稀



05A06353





05A06354




05A06354




鑑評碼: 05A06354
 種種(系)名稱(英文): PI 183250
 種子長(公厘): 10.73
 種子寬(公厘): 6.70
 種子厚(公厘): 6.02
 種子形狀: 橢圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 白
 種臍環色: 深褐
 種子表面: 光滑
 百粒種子重(公克): 23.13
 幼莢胚軸長(公分): 2.78
 主莢節間長短(公分): 2.30
 主莢粗細(公分): 0.83
 茎色: 綠
 分枝性: 強
 分枝密度: 亂
 雄橈性: 強
 小葉長(公分): 9.20
 小葉寬(公分): 8.05
 小葉形狀: 圓闊形
 葉色: 深綠
 托葉長培(公釐): 11.25
 植型: 無閉型
 植勢: 強大旺盛
 植株色: 黃
 撫種至開花日數(天): 97
 開花至採收日數(天): 8
 第一花序產生節位(節): 1
 每一花序數(分): 3
 花色: 白
 每花序著花數(數): 2~3
 黃長(公分): 18.40
 黃寬(公分): 0.94
 黃厚(公分): 0.86
 黃莢彎曲度: 直
 黃莢表面: 平滑
 黃莢橫徑: 平
 黃莢軟硬: 優
 黃莢結紮: 強
 黃莢肉厚: 多
 黃莢肉厚(公克): 1.64
 黃莢色澤: 雲綠
 黃莢色澤: 少
 黃莢形: 実
 黃莢老化: 快
 每黃種仁數(粒): 11~12
 種仁配列: 整
 單莢重(公克): 9.90
 鹽低結莢直徑(公分): 12.50
 黃莢脫離易: 易

鑑評碼: 05A06357
 種子長(公厘): 8.46
 種子寬(公厘): 5.86
 種子厚(公厘): 4.91
 種子形狀: 橢圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 白
 種臍環色: 茶褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 13.30
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莢節間長短(公分): 短
 主莢粗細(公分): 粗
 葉色: 綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.50
 小葉寬(公分): 4.00
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 深綠
 植型: 半荷葉型
 植勢: 強大旺盛
 植株色: 多
 萩種至開花日數(天): 40
 開花至採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 6
 每一花序花數(數): 2~3
 花色: 其他
 每花序著花數(數): 2~3
 黃長(公分): 12.60
 黃寬(公分): 0.80
 黃厚(公分): 0.60
 黃莢彎曲度: 直
 黃莢表面: 平滑
 黃莢橫斷面: 橢圓
 黃莢肉質: 中
 黃莢肉厚(公厘): 中
 黃莢色澤: 綠
 黃莢色: 無
 黃莢形: 実
 黃莢老化: 中
 每黃種仁數(粒): 4
 種仁配列: 整
 單莢重(公克): 4.29
 鹽低結莢直徑(公分): 42.00
 黃莢脫離難: 難



05A06357





05A06358




鑑評碼: 05A06358
 穗子長(公厘): 7.72
 穗子寬(公厘): 5.79
 穗子厚(公厘): 4.86
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑紋: 有
 穗皮底色: 淡黃
 穗皮斑紋(側)色: 茄褐
 穗體環色: 暗褐
 穗子表面: 中
 百粒穗子重(公克): 15.00
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 相
 色葉: 綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.30
 小葉寬(公分): 3.00
 小葉形狀: 橢圓形
 葉色: 淺綠
 枝型: 有腋型
 枝熟: 很大旺盛
 枝株色素: 中
 撫種至開花日數(天): 51
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序產生節位(節): 8
 每一花序著生數(朵): 2~3
 花色: 紅
 花序著葉數(葉): 2~3
 黃長(公分): 16.00
 黃寬(公分): 0.68
 黃厚(公分): 0.64
 黃葉彎曲度: 相曲
 黃葉表面: 光滑
 黃葉脈瘤: 有
 黃葉肉質: 中
 嫩莢肉厚(公厘): 中
 嫩莢色澤: 淡綠
 莖尖形: 平
 莖尖老化: 中
 每莢種仁數(粒): 13
 單莢重(公克): 5.74
 單莢低蛋白質(公分): 40.00
 黃梗脫離性: 強

鑑評碼: 05A06361
 穗子長(公厘): 6.32
 穗子寬(公厘): 6.16
 穗子厚(公厘): 4.96
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑紋: 有
 穗皮底色: 白
 穗皮環色: 暗褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 14.20
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 粗
 葉色: 綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 7.00
 小葉寬(公分): 4.50
 小葉形狀: 橢圓形
 葉色: 淺綠
 枝型: 有腋型
 枝熟: 很大旺盛
 枝株色素: 多
 撫種至開花日數(天): 61
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序著生數(朵): 2~4
 花色: 白
 花序著葉數(葉): 2~4
 黃長(公分): 13.00
 黃寬(公分): 0.58
 黃厚(公分): 0.49
 嫩莢彎曲度: 弧曲
 嫩葉表面: 平滑
 嫩莢橫斷面: 圓圓
 嫩莢肉質: 中
 嫩莢肉厚(公厘): 薄
 嫩莢色澤: 淡綠
 莖尖色澤: 中
 莖尖形: 中
 莖尖老化: 快
 單莢種仁數(粒): 15
 單莢配列: 密
 單莢重(公克): 2.63
 單莢低蛋白質(公分): 35.00
 黃梗脫離性: 強



05A06361





05A06363



鑑評碼: 05A06363
 穗子長(公厘): 8.07
 穗子寬(公厘): 6.16
 穗子厚(公厘): 4.35
 穗子形狀: 條形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 淡褐
 穗體暗色: 淡褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 15.60
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 相
 莖色: 淡綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 7.40
 小葉寬(公分): 4.60
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 淺綠
 枝型: 半直型
 伸勢: 強大伸強
 穗株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 37
 開花至摘莢採收日數(天): 10
 第一花序著生節位(節): 7
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 紫
 每花序著黃數(朵): 2~4
 黃數(公分): 16.50
 黃寬(公分): 0.80
 黃厚(公分): 0.60
 斜黃彎曲度: 直曲
 斜黃表裏: 平滑
 斜黃橫斷面: 倒圓
 斜黃肉質: 中
 斜黃肉厚(公厘): 中
 斜黃色澤: 淡綠
 黃色色調: 無
 黃尖形: 尖
 斜黃老化: 強
 每萬穗仁數(粒): 11
 穗仁配列: 直
 穗莢重(公克): 5.80
 穗莢結莢莢高度(公分): 30.00
 莖梗脫離性: 粘

鑑評碼: 05A06364
 穗子長(公厘): 8.11
 穗子寬(公厘): 5.02
 穗子厚(公厘): 5.04
 穗子形狀: 條形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 白
 穗體暗色: 茶褐
 穗子表面: 中
 百粒穗子重(公克): 15.40
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 中
 莖色: 绿
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 7.00
 小葉寬(公分): 4.50
 小葉形狀: 頸形
 葉色: 深綠
 枝型: 有瘤型
 伸勢: 強大伸強
 穗株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 50
 開花至摘莢採收日數(天): 10
 第一花序著生節位(節): 3
 每一花序花數(朵): 3~5
 花色: 其他
 每花序著黃數(朵): 3~5
 黃數(公分): 14.5
 黃寬(公分): 0.75
 黃厚(公分): 0.61
 斜黃彎曲度: 弯曲
 斜黃表裏: 粗糙
 斜黃橫斷面: 倒圓
 斜黃肉質: 中
 斜黃肉厚(公厘): 中
 斜黃色澤: 深綠
 黃尖形: 無
 黃尖形: 尖
 斜黃老化: 中
 每萬穗仁數(粒): 12
 穗仁配列: 中
 穗莢重(公克): 4.11
 穗莢結莢莢高度(公分): 18.00
 莖梗脫離性: 粘



05A06364





鑑評碼: 05A06370
 穗子長(公厘): 6.52
 穗子寬(公厘): 5.48
 穗子厚(公厘): 4.45
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑點: 無
 穗皮底色: 白
 穗體暗色: 沒有
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 11.40
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莢節間長短(公分): 短
 主莢粗細(公分): 粗
 莖色: 綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.60
 小葉寬(公分): 3.70
 小葉形狀: 扇針形
 花色: 淡綠
 柱型: 半育葉型
 性勢: 常通
 穗株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 33
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 每一花序著生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 3~5
 花色: 淡紫紅
 每花序葉數(葉): 3~5
 黃葉(公分): 16.00
 黃葉(公分): 0.60
 美肩(公分): 0.50
 寬黃瓣曲度: 直曲
 寬黃表背: 圓和扁
 寬黃橫斷面: 圓
 嫩莢肉質: 中
 嫩莢內厚(公厘): 中
 嫩黃色澤: 淺
 黃葉色調: 中
 莖尖形: 尖
 嫩黃老化: 中
 每百種仁數(粒): 10
 種仁配列: 密
 單莢重(公克): 40.00
 單株結莢量(公分): 30.00
 莖梗脫離性: 無



鑑評碼: 05A06372
 穗子長(公厘): 6.41
 穗子寬(公厘): 5.49
 穗子厚(公厘): 4.48
 穗子形狀: 扇形
 穗皮斑點: 無
 穗皮底色: 黑
 穗體暗色: 暗褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 11.10
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莢節間長短(公分): 短
 主莢粗細(公分): 粗
 莖色: 綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 6.20
 小葉寬(公分): 4.30
 小葉形狀: 扇針形
 花色: 淡綠
 柱型: 有稜型
 性勢: 強大旺盛
 穗株色調: 多
 撫種至開花日數(天): 51
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 8
 每一花序花數(朵): 2~5
 花色: 紫
 每花序葉數(葉): 2~5
 黃葉(公分): 15.30
 黃葉(公分): 0.72
 美肩(公分): 0.63
 寬黃瓣曲度: 直曲
 寬黃表背: 平滑
 嫩黃橫斷面: 圓
 嫩莢肉質: 中
 嫩莢厚度(公厘): 中
 嫩黃色澤: 淺綠
 黃葉色調: 無
 莖尖形: 尖
 嫩黃老化: 檗
 單莢仁數(粒): 16
 種仁配列: 密
 單莢重(公克): 5.49
 單株結莢量(公分): 54.00
 莖梗脫離性: 無






05A6378



鑑評碼: 05A6378
 品種(系)名稱(中文): 紅仁青皮
 種子長(公厘): 9.46
 種子寬(公厘): 5.67
 種子厚(公厘): 4.38
 種子形狀: 扁圓形
 種皮底色: 綠
 種皮近紅(點)色_紅褐
 種皮暗綠色_綠褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 13.68
 主莢圓筒長寬規(公分): 8.30
 莖色: 淡綠
 分枝性: 強
 分枝適性: 劑割
 讀繩性: 強
 小葉面積(公分²): 13.10
 小葉寬(公分): 10.20
 小葉形狀: 長橢圓狀披針形
 葉色: 綠
 葉型: 無限型
 株勢: 粗大直莖
 檀株色素: 無
 撫種至開花日數(天): 52
 開花至嫩莢採收日數(天): 15
 第一花序產生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 1~2
 花色: 淡紫紅
 每花序著莢數(朵): 2~3
 美熟(公分): 21.7
 黃寬(公分): 0.65
 黃厚(公分): 0.75
 黃黃體溫度: 相當
 黃黃基部: 相應
 黃黃橫幅: 相應
 黃黃肉質: 滑嫩
 黃黃色澤: 深綠
 黃尖形: 平
 黃黃老仁: 中
 每莢種仁數(粒): 11
 種仁配列: 中
 單莢重(公克): 7.06
 種仁低結莢溫度(公分): 10.00
 黃梗腹裂性: 易



05A6381



鑑評碼: 05A6381
 品種(系)名稱(中文): 黑斑豇豆
 種子長(公厘): 10.57
 種子寬(公厘): 6.67
 種子厚(公厘): 5.05
 種子形狀: 扁圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 淡黃
 種皮邊色: 暗褐
 種子表面: 中
 百粒種子重(公克): 22.68
 主莢圓筒長寬規(公分): 4.70
 莖色: 淡綠
 分枝性: 中
 分枝適性: 強
 読繩性: 強
 小葉長(公分): 17.80
 小葉寬(公分): 12.70
 小葉形狀: 鋸形
 葉色: 綠
 葉型: 無限型
 株勢: 粗大直莖
 檀株色素: 無
 撫種至開花日數(天): 25
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序產生節位(節): 6
 每一花序花數(朵): 3~4
 花色: 白
 每花序著莢數(朵): 2~3
 美熟(公分): 47.70
 黃寬(公分): 0.98
 黃厚(公分): 1.19
 黃黃體溫度: 極高
 黃黃表面: 平滑
 黃黃橫斷面: 圓
 黃黃肉質: 中
 黃黃色澤: 深綠
 黃黃色素: 無
 黃尖形: 尖
 黃黃老仁: 中
 每莢種仁數(粒): 13
 種仁配列: 游
 單莢重(公克): 27.45
 種仁低結莢溫度(公分): 15.50
 黃梗腹裂性: 易



編號: 06A00328
 穗子長(公厘): 7.88
 穗子寬(公厘): 4.91
 穗子厚(公厘): 3.84
 穗子形狀: 腎瓣形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 淡褐
 穗穎頂色: 茶褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 10.20
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 粗
 葉色: 深
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 6.80
 小葉寬(公分): 3.80
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 深綠
 植型: 半有稈型
 植勢: 強大旺盛
 植株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 39
 開花至青黃採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著黃數(朵): 2~3
 黃數(公分): 16.00
 黃寬(公分): 0.60
 黃厚(公分): 0.15
 青黃彎曲度: 直
 青黃表面: 光滑
 青黃橫斷面: 倒圓
 青黃肉質: 密
 青黃肉厚(公厘): 中
 青黃色澤: 綠
 青黃色調: 無
 葉尖形: 中
 青黃老化: 中
 每萬穗仁數(粒): 18
 穗仁配列: 密
 穗莢重(公克): 3.95
 穗低結莢莢直度(公分): 23.00
 莖莢脫離性: 無



編號: 06A00329
 穗子長(公厘): 7.39
 穗子寬(公厘): 4.82
 穗子厚(公厘): 3.93
 穗子形狀: 腎瓣形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 淡黃
 穗穎頂色: 茶褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 10.50
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 粗
 葉色: 深
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 6.00
 小葉寬(公分): 3.70
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 深綠
 植型: 有稈型
 植勢: 強大旺盛
 植株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 42
 開花至青黃採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序著黃數(朵): 2~3
 黃數(公分): 16.00
 黃寬(公分): 0.60
 黃厚(公分): 0.17
 青黃彎曲度: 略曲
 青黃表面: 光滑
 青黃橫斷面: 倒圓
 青黃肉質: 密
 青黃肉厚(公厘): 薄
 青黃色澤: 綠
 青黃色調: 少
 葉尖形: 尖
 青黃老化: 標
 每萬穗仁數(粒): 12
 穗仁配列: 密
 穗莢重(公克): 5.28
 穗低結莢莢直度(公分): 22.00
 莖莢脫離性: 無



06A00338



標號碼: 06A00338
 穗子長(公厘): 9.15
 穗子寬(公厘): 5.34
 穗子厚(公厘): 4.67
 穗子形狀: 條形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 白
 穗體頂色: 白
 穗子表面: 光滑
 百粒穗子重(公克): 16.20
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莖節間長(公分): 短
 主莖粗細(公分): 中
 莖色: 綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 6.20
 小葉寬(公分): 4.70
 小葉形狀: 扇形披針形
 葉色: 深綠
 葉型: 半有翼型
 葉勢: 直大而強
 穗株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 33
 開花至摘莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序著生數(朵): 2~3
 花色: 淡紫紅
 每花序著生數(朵): 2~3
 黃熟(公分): 15.50
 黃熟(公分): 0.70
 黃熟(公分): 0.70
 斜黃瓣曲度: 弧曲
 斜黃表皮: 粗糙
 斜黃橫脈: 清晰
 斜黃肉質: 密密
 斜黃肉厚(公厘): 中
 斜黃色澤: 中
 斜尖形: 中
 斜黃老化: 嫩
 每萬穗仁數(粒): 11
 穗仁配列: 密
 穗莢重(公克): 4.14
 穗低結莢莢厚度(公分): 36.00
 斜黃脫離性: 莖

標號碼: 06A00339
 穗子長(公厘): 7.66
 穗子寬(公厘): 5.49
 穗子厚(公厘): 4.54
 穗子形狀: 條形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 淺黃
 穗體頂色: 嫩褐
 穗子表面: 中
 百粒穗子重(公克): 132.69
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莖節間長(公分): 短
 主莖粗細(公分): 中
 莖色: 深綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 6.00
 小葉寬(公分): 4.30
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 綠
 葉型: 有翼型
 葉勢: 直通
 穗株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 47
 開花至摘莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 4
 每一花序著生數(朵): 2~5
 花色: 淡紫紅
 每花序著生數(朵): 2~5
 黃熟(公分): 15.00
 黃熟(公分): 0.80
 黃熟(公分): 0.52
 斜黃瓣曲度: 弧曲
 斜黃表皮: 粗糙
 斜黃橫脈: 清晰
 斜黃肉質: 清潔
 斜黃肉厚(公厘): 中
 斜黃色澤: 淺綠
 斜尖形: 中
 斜黃老化: 嫩
 每萬穗仁數(粒): 10
 穗仁配列: 密
 穗莢重(公克): 4.43
 穗低結莢莢厚度(公分): 18.00
 斜黃脫離性: 莖



06A00339





標號碼: 06A00340
 櫛子長(公厘): 7.64
 櫛子寬(公厘): 5.31
 櫛子厚(公厘): 4.28
 櫛子形狀: 橢圓形
 櫛皮斑紋: 無
 櫛皮底色: 白
 櫛體頂色: 紅褐
 櫛子表面: 平滑
 百粒櫛子重(公克): 14.0
 幼莢胚軸長(公分): 長
 主莢節間距(公分): 短
 主莢粗細(公分): 粗
 莖色: 綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 6.00
 小葉寬(公分): 4.00
 小葉形狀: 扇形
 葉色: 灰綠
 檍型: 半有擋型
 檍勢: 普通
 檍株色調: 多
 撫種至開花日數(天): 46
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 6
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 其他
 倒花序著葉數(葉): 2~4
 黃熟(公分): 18.50
 黃寬(公分): 0.70
 黃厚(公分): 0.76
 斜黃彎曲度: 直
 傷黃表背: 平滑
 傷黃橫斷面: 滌
 傷黃肉質: 密
 傷黃肉厚(公厘): 2.00
 傷黃色澤: 綠
 黃尖形: 中
 黃老化: 慢
 每萬株仁數(粒): 14
 櫛仁配列: 中
 莖莢重(公克): 8.50
 莖低結莢高(公分): 25.00
 莖莢脫離性: 莖

標號碼: 06A00341
 櫛子長(公厘): 7.81
 櫛子寬(公厘): 6.40
 櫛子厚(公厘): 5.34
 櫛子形狀: 橢圓形
 櫛皮斑紋: 無
 櫛皮底色: 紅褐
 櫛體頂色: 茶褐
 櫛子表面: 平滑
 百粒櫛子重(公克): 14.30
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莢節間長短(公分): 短
 主莢粗細(公分): 粗
 莖色: 濃綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 6.60
 小葉寬(公分): 4.20
 小葉形狀: 扇圓形
 葉色: 濃綠
 檍型: 半有擋型
 檍勢: 強大旺盛
 檍株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 36
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 紫
 倒花序著葉數(葉): 2~4
 黃熟(公分): 17.50
 黃寬(公分): 0.70
 黃厚(公分): 0.70
 斜黃彎曲度: 直
 傷黃表背: 粗糙
 傷黃橫斷面: 滌圓
 傷黃肉質: 中
 傷黃肉厚(公厘): 中
 傷黃色澤: 濃綠
 黃尖形: 角
 黃老化: 慢
 每萬株仁數(粒): 17
 櫛仁配列: 密
 莖莢重(公克): 6.02
 莖低結莢高(公分): 20.00
 莖莢脫離性: 莖





06A00342



鑑評碼: 06A00342
 穗子長(公厘): 8.21
 穗子寬(公厘): 5.34
 穗子厚(公厘): 4.53
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑紋: 無
 穗皮底色: 白
 穗體頂色: 白
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 14.00
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莢節間距(公分): 短
 主莢粗細(公分): 相
 莖色: 灰綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.50
 小葉寬(公分): 3.70
 小葉形狀: 卵針形
 葉色: 灰綠
 株型: 半有稈型
 株勢: 直大旺盛
 穗株色素: 多
 撫種至開花日數(天): 45
 開花至莢實採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 11
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 淡紫紅
 蕊花序葉片數(葉): 2~3
 黃葉(公分): 19.20
 黃葉(公分): 0.70
 美厚(公分): 0.60
 斜黃瓣曲度: 直
 斜黃英表面: 平滑
 斜黃橫斷面: 側面
 斜黃肉質: 密
 斜黃肉厚(公厘): 中
 頂黃色澤: 淡綠
 黃色色澤: 中
 黃尖形: 完
 黃葉老化: 嫩
 每萬穗仁數(粒): 14
 穗仁剖形: 圓
 單莢重(公克): 6.24
 莖叢結莢黃度(公分): 30.00
 黃葉脫離性: 連

鑑評碼: 06A00348
 穗子長(公厘): 7.28
 穗子寬(公厘): 5.69
 穗子厚(公厘): 4.56
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑紋: 有
 穗皮底色: 白
 穗體頂色: 赤褐
 穗體側色: 苍褐
 穗子表面: 中
 百粒穗子重(公克): 14.20
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莢節間距(公分): 中
 主莢粗細(公分): 中
 莖色: 紅
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 4.00
 小葉寬(公分): 3.80
 小葉形狀: 卵狀披針形
 葉色: 紅
 株型: 半有稈型
 株勢: 直大旺盛
 穗株色素: 多
 撫種至開花日數(天): 45
 開花至莢實採收日數(天): 10
 第一花序著生節位(節): 7
 每一花序花數(朵): 2~4
 花色: 淡紫紅
 蕊花序葉片數(葉): 2~4
 黃葉(公分): 12.00
 黃葉(公分): 0.57
 黃厚(公分): 0.53
 斜黃瓣曲度: 曲
 斜黃英表面: 軟滑
 斜黃橫斷面: 側面
 斜黃肉質: 優
 斜黃肉厚(公厘): 滑
 斜黃色澤: 綠
 黃尖形: 無
 黃葉老化: 嫩
 黃葉種仁(粒): 9
 穗仁剖形: 圓
 單莢重(公克): 3.57
 莖叢結莢黃度(公分): 30.00
 黃葉脫離性: 連



06A00348





06A00350



鑑評碼: 06A00350
 穗子長(公厘): 6.12
 穗子寬(公厘): 5.37
 穗子厚(公厘): 4.05
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑點: 有
 穗皮底色: 白
 穗皮斑紋顏色: 暗褐
 穗體顏色: 荒褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 10.30
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莢節間距(公分): 矮
 主莢粗細(公分): 中
 莖色: 綠
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.80
 小葉寬(公分): 3.00
 小葉形狀: 長卵圓狀披針形
 莖色: 淡綠
 植型: 半直半攀型
 植熟: 豐滿
 穗株色素: 少
 播種至開花日數(天): 33
 開花至嫩莢採收日數(天): 10
 第一花序產生節位(節): 4
 每一花序花數(朵): 1~3
 花色: 淡紫紅
 每花序著果數(莢): 1~3
 黃長(公分): 16.00
 黃寬(公分): 0.70
 黃厚(公分): 0.60
 嫩莢嘴曲度: 直
 嫩莢表質: 光滑
 嫩莢種瘤: 濕
 嫩莢肉質: 中
 嫩莢肉厚(公厘): 厚
 嫩莢色澤: 深綠
 莖尖形: 尖
 莖尖形: 尖
 莖黃老化: 中
 每莢種仁數(粒): 10
 種仁配列: 整
 單莢重(公克): 5.69
 穗低結莢高度(公分): 30.00
 穗梗脫離性: 強

鑑評碼: 06A00351
 穗子長(公厘): 6.75
 穗子寬(公厘): 5.85
 穗子厚(公厘): 4.35
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑點: 有
 穗皮底色: 白
 穗皮斑紋顏色: 赭褐
 穗體顏色: 荒褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 14.30
 幼莢胚軸長(公分): 長
 主莢節間距(公分): 中
 主莢粗細(公分): 粗
 莖色: 綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 3.40
 小葉寬(公分): 3.00
 小葉形狀: 長卵圓狀披針形
 莖色: 綠
 植型: 半直半攀型
 植熟: 粗大旺盛
 穗株色素: 多
 播種至開花日數(天): 50
 開花至嫩莢採收日數(天): 9
 第一花序產生節位(節): 3
 每一花序花數(朵): 1~4
 花色: 其他
 每花序著果數(莢): 1~4
 黃長(公分): 11.50
 黃寬(公分): 0.73
 黃厚(公分): 0.71
 嫩莢嘴曲度: 曲
 嫩莢表面: 平滑
 嫩莢種瘤斷面: 橢圓
 嫩莢肉質: 中
 嫩莢肉厚(公厘): 中
 嫩莢色澤: 深綠
 莖尖色素: 無
 莖尖形: 尖
 莖黃老化: 優
 單莢種仁數(粒): 10
 種仁配列: 整
 單莢重(公克): 3.63
 穗低結莢高度(公分): 33.00
 穗梗脫離性: 強



06A00351






鑑評碼: 06A00353
 穗子長(公厘): 6.04
 穗子寬(公厘): 6.03
 穗子厚(公厘): 4.14
 穗子形狀: 橢圓形
 穗皮斑點: 無
 穗皮底色: 白
 穗體暗色: 褐
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 10.80
 幼莢胚軸長(公分): 短
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 粗
 莖色: 深
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.20
 小葉寬(公分): 3.30
 小葉形狀: 椭圓形
 葉色: 深綠
 葉型: 有鋸齒
 葉勢: 直大而強
 穗株色調: 多
 撫種至開花日數(天): 51
 開花至摘莢採收日數(天): 9
 第一花序著生節位(節): 3
 每一花序花數(朵): 1~3
 花色: 白
 每花序著黃數(朵): 1~3
 黃熟(公分): 16.50
 黃寬(公分): 0.68
 黃厚(公分): 0.61
 斜黃瓣曲度: 直
 斜黃表面: 平滑
 斜黃橫斷面: 側面
 斜黃肉質: 肥厚
 斜黃肉厚(公厘): 中
 斜黃色澤: 淡綠
 斜黃色調: 少
 莖尖形: 尖
 斜黃老化: 中
 每萬穗仁數(粒): 11
 穗仁配列: 中
 穗莢重(公克): 5.66
 穗低結莢莢高(公分): 30.00
 莖莢脫離性: 莖

鑑評碼: 06A00356
 穗子長(公厘): 6.30
 穗子寬(公厘): 5.03
 穗子厚(公厘): 4.22
 穗子形狀: 扁形
 穗皮斑點: 無
 穗皮底色: 白
 穗體暗色: 單褐色
 穗子表面: 平滑
 百粒穗子重(公克): 8.60
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莖節間長短(公分): 短
 主莖粗細(公分): 粗
 莖色: 深
 分枝性: 強
 小葉長(公分): 5.70
 小葉寬(公分): 3.50
 小葉形狀: 披針形
 葉色: 深綠
 葉型: 有鋸齒
 葉勢: 強
 穗株色調: 中
 撫種至開花日數(天): 34
 開花至摘莢採收日數(天): 10
 第一花序著生節位(節): 5
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 其他
 每花序著黃數(朵): 2~3
 黃熟(公分): 17.50
 黃寬(公分): 0.70
 黃厚(公分): 0.60
 斜黃瓣曲度: 弯曲
 斜黃表面: 平滑
 斜黃橫斷面: 圓
 斜黃肉質: 肥厚
 斜黃肉厚(公厘): 中
 斜黃色澤: 淡綠
 斜黃色調: 中
 莖尖形: 尖
 斜黃老化: 中
 每萬穗仁數(粒): 9
 穗仁配列: 密
 穗莢重(公克): 4.77
 穗低結莢莢高(公分): 45.00
 莖莢脫離性: 莖





06A00358



種子碼: 06A00358
 種子長(公厘): 7.17
 種子寬(公厘): 5.46
 種子厚(公厘): 4.99
 種子形状: 橢圓形
 種皮斑紋: 無
 種皮底色: 綠
 種臍環色: 無
 種子表面: 平滑
 百粒種子重(公克): 14.10
 幼莢胚軸長(公分): 中
 主莢節間長短(公分): 短
 主莢粗細(公分): 粗
 莖色: 綠
 分枝性: 中
 小葉長(公分): 7.50
 小葉寬(公分): 4.70
 小葉形状: 勇狀披針形
 葉色: 綠
 株型: 無混型
 伸勢: 直大直進
 種株色調: 少
 撫種至開花日數(天): 37
 開花至青黃採收日數(天): 10
 每一花序著生節位(節): 7
 每一花序花數(朵): 2~3
 花色: 紫
 每花序葉黃數(葉): 2~3
 黃葉(公分): 18.00
 黃葉(公分): 0.80
 美肩(公分): 0.70
 斜黃瓣曲度: 弧曲
 斜黃瓣長: 短粗
 斜黃瓣微曲度: 滾
 斜黃瓣內質: 緩密
 斜黃瓣肉厚(公厘): 滅
 青黃色澤: 淡綠
 黃尖色調: 少
 黃尖形: 宽
 黃黃老化: 暫
 每萬種仁數(粒):
 種仁配列: 直
 種莢重(公克): 4.82
 種莢長(公厘): 43.00
 種莢脫離性: 乾



豇豆種原圖說

Vigna unguiculata (L.) Walp. Germplasm Illustrations

邱輝龍、林楨祐—編

台中市：行政院農業委員會農業試驗所，民104.12

102頁, 15X21公分(菊16開)

ISBN: 978-986-04-7744-3

1.豇豆 2.種原多樣性 3.科普教育

發行人：陳駿季

編者：邱輝龍、林楨祐

調查與攝影：張振嘉、林明顯、石家宇、吳苑玲

黃惠玲、黃雅穗、陳宣蘋、劉秀菊

出版者：行政院農業委員會農業試驗所

地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號

電話：(04)2330-2301

網址：<http://www.tari.gov.tw>

印刷：峰林實業有限公司

出版日期：104年12月

定價：200元

ISBN : 978-986-04-7744-3

GPN : 101403459

展售處：國家書店 台北市松江路209號1樓 (02)2518-0207

五南文化廣場 台中市中山路2號 (04)2226-0330