

吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations



吉豆與爪哇大豆種原圖說
Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations
行政院農業委員會農業試驗所



吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations



行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301 傳真：(04)23338162



序言

聯合國糧食及農業組織 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 將西元2016年指定為國際豆類年 (International Year of Pulses 2016, IYP 2016)。這是聯合國自西元1957年以來，繼種子、稻米、馬鈴薯及藜粟後，第五次以農作物作為國際年的主題，其目的是希望藉由此一活動，呼籲世界各國重視各類乾豆對於人類、農業、土壤及農村經濟等方面的重要性。豆類作物營養豐富、種類繁多且用途廣泛，因此，國際豆類年是以「提供豐富營養、促進永續發展」為口號，將許多豆類作物納入推廣種植範圍，包括以乾燥或新鮮種子為食用部位的吉豆、紅豆、綠豆、豌豆、菜豆、長豇豆...，以及作為畜牧用飼料或綠肥的爪哇大豆、苜蓿或紫雲英。

吉豆 (*Vigna mungo* L.) 為豆科蝶形花亞科植物，原生於亞洲乾燥的熱帶氣候區，主要分布於巴基斯坦、緬甸和印度。吉豆種子煮熟後，可供人類日常食用，磨成粉末可以製作麵包，因其種皮有黑、灰、棕或暗綠等顏色，大小又與一般的綠豆相似，故又名黑吉豆或黑綠豆 (Black gram)。爪哇大豆 (*Neonotonia wightii*) 為豆科蝶形花亞科多年生藤蔓植物，在臺灣屬於外來歸化種，大多自生於國內中、南部海拔500公尺以下的山地或荒埔，故又名野生大豆，主要供作畜牧飼料或綠肥等用途。本所為響應國際豆類年的宣導主題，並為檢測低溫保存於中期庫10年以上的吉豆和爪哇大豆種子活力，以及強化生育性狀資料調查與影像收集，本年度與國立屏東科技大學合作，進行前述二種作物種原的更新和繁殖試驗。

本書將每個吉豆和爪哇大豆的品種 (系)，以一份特性調查表搭配植株、葉片、花朵、果莢與種子等外觀圖片，顯現種原的多樣性。這些圖文資料，也可以提供育種人員進行作物改良與研究之參考。本書能順利出版，係承蒙行政院農業委員會「種子庫暨種原資訊系統管理、種原離體保存與種子活力檢測」計畫〔105農科-9.7.1-農-C5(3)〕經費支持，特此申謝。

行政院農業委員會農業試驗所
所長

陳駿季

中華民國一〇五年十二月

編者按

本書收錄44種吉豆及35種爪哇大豆種原，並輔以450幀以上彩色圖片對照說明，因採用播種方式繁殖，故有數個品種(系)因遺傳質之差異，其種子外觀和種皮顏色出現不盡相同的情形，為維持原始提供單位之資料完整性和種原多樣性，故同一編碼之吉豆或爪哇大豆種原，即使種子出現不同種皮顏色，編者依舊保留完整圖片資料。書中另將各品種(系)發芽率和性狀調查表檢定標準等資料，列於書末附錄供讀者參閱和對照，特此說明。

本書在編輯期間雖已力求周延，惟內容疏漏之處在所難免，尚祈各界賢達及先進們不吝指正。本項試驗工作能順利完成，首先要感謝國立屏東科技大學農園生產系師生提供的設施和支援，本書在編撰期間也承蒙本組溫英杰組長，以及陳述博士、魏趨開技佐、蘇秀炫小姐、劉佳慧小姐等同仁的鼎力協助，在此一併致謝。



吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

目錄 1

爪哇大豆

暫時碼

頁次

00A05215	1
00A05216	2
00A05217	3
00A05218	4
00A05219	5
00A05220	6
00A05221	7
00A05222	8
00A05223	9
00A05224	10
00A05225	11
00A05226	12
00A05227	13
00A05228	14
00A05229	15
00A05230	16
00A05231	17
00A05232	18
00A05233	19
00A05234	20
00A05235	21
99A00121	22



目錄 2

暫時碼

頁次

99A00122	23
99A00123	24
99A00124	25
99A00125	26
99A00126	27
99A00127	28
99A00128	29
99A00129	30
99A00130	31
99A00131	32
99A00132	33
99A00133	34
99A00134	35
05A01696	36
05A01717	37
05A01729	38
06A00680	39
06A00688	40
06A00689	41
06A00693	42
06A00701	43
06A00708	44

爪哇大豆

吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

目錄 3

暫時碼	頁次
06A00712	45
06A00713	46
06A00714	47
06A00715	48
06A00724	49
06A00725	50
06A00727	51
06A00733	52
06A00735	53
06A00736	54
06A00738	55
06A00743	56
06A00744	57
06A00745	58
06A00746	59
06A00747	60
06A00754	61
06A00763	62
06A00773	63
06A00774	64
06A00801	65
06A00802	66



目錄 4

暫時碼

頁次

06A00803	67
06A00835	68
06A00836	69
06A00843	70
06A00844	71
06A00847	72
06A00860	73
06A00861	74
06A00870	75
06A00891	76
06A00897	77
06A00898	78
06A00902	79
附錄一	80~81
附錄二	82
附錄三	83~93

吉豆

吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

00A05215

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☒ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05216

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
 3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
 4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
 5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
 6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
 7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
 11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
 15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
 19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
 21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
 22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
 23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
 24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
 25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
 26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
 28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
 29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05217

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05218

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
 3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
 4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
 5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 (3) 扁
 6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
 7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
 11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 (5) 極晚
 13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
 15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
 19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
 21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
 22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
 23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
 24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
 25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
 26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
 28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
 29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05219

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☐ (2) 白 ☒ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☒ (1) 黃 ☐ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05220

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
 3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☐ (2) 白 ☒ (3) 褐
 4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
 5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
 6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
 7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
 11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
 13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
 15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
 19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
 21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
 22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
 23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
 24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
 25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☒ (3) 強
 26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
 28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
 29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05221

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☒ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☐ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☐ (2) 白 ☒ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☒ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他


27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05222

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☒ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☒ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05223

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☒ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05224

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種膚色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05225

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05226

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
 3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
 4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
 5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
 6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
 7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
 9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
 11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
 15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
 16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
 19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
 21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
 22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
 23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
 24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
 25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
 26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
 28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
 29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05227

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05228

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05229

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☒ (1) 黃 ☐ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05230

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☒ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05231

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☒ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05232

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☒ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☒ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05233

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05234

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☒ (3) 半無限 ☐ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☐ (1) 白 ☒ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☒ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



00A05235

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☒ (2) 褐 ☐ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00121

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☒ (3) 半無限 ☐ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☐ (2) 白 ☒ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00122

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☒ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☒ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱

99A00123

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☒ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☒ (1) 黃 ☐ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00124

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☒ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☒ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☒ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00125

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☒ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難


七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱

99A00126

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
 3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
 4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
 5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
 6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
 7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
 11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
 15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
 16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
 17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
 18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
 19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
 21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
 22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☒ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
 23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☒ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
 24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
 25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
 26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☒ (5) 極強
 28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
 29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00127

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢



14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☒ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☒ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00128

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☒ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☐ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00129

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☒ (1) 黃 ☐ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00130

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☐ (6) 褐 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00131

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限
☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢


14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00132

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☒ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☒ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☒ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☒ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☒ (5) 淡褐
☐ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐
☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他


27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☒ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00133

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☒ (2) 白 ☐ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☒ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☐ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☐ (2) 直 ☒ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☒ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☐ (3) 中 ☐ (4) 高 ☒ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☐ (3) 銳卵形 ☒ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☒ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☐ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☒ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☐ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☐ (2) 弱 ☒ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



99A00134

爪哇大豆 (Rhodesian Kudzu)

品種特性



一、植株：

1. 株型：☐ (1) 有限 ☐ (2) 半有限 ☐ (3) 半無限 ☒ (4) 無限

二、莖

2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
3. 主莖茸毛色澤：☐ (1) 無 ☐ (2) 白 ☒ (3) 褐
4. 主莖茸毛多少：☐ (1) 無 ☐ (2) 疏 ☐ (3) 中 ☒ (4) 密
5. 主莖茸毛形狀：☐ (1) 無 ☒ (2) 直 ☐ (3) 扁
6. 主莖高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高
7. 分枝數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
8. 主莖節數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☒ (4) 多 ☐ (5) 極多
9. 結莢高度：☐ (1) 極低 ☐ (2) 低 ☒ (3) 中 ☐ (4) 高 ☐ (5) 極高

三、葉

10. 小葉數：☒ (1) 3枚葉 ☐ (2) 5枚葉 ☐ (3) 7枚葉
11. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 菱形 ☒ (3) 銳卵形 ☐ (4) 卵圓形

四、花

12. 開花期：☐ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☒ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
13. 花色：☒ (1) 白 ☐ (2) 紫

五、鮮豆莢及乾豆莢

14. 鮮莢色澤：☒ (1) 淡綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 濃綠
15. 單株總莢數：☐ (1) 極少 ☒ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☐ (5) 極多
16. 單莢粒數：☐ (1) 極少 ☐ (2) 少 ☐ (3) 中 ☐ (4) 多 ☒ (5) 極多
17. 乾莢成熟期：☒ (1) 極早 ☐ (2) 早 ☐ (3) 中 ☐ (4) 晚 ☐ (5) 極晚
18. 乾莢色澤：☐ (1) 淡褐 ☐ (2) 褐 ☒ (3) 暗褐
19. 裂莢性：☐ (1) 易 ☐ (2) 中 ☒ (3) 難

六、種子

20. 種子大小：☒ (1) 極小 ☐ (2) 小 ☐ (3) 中 ☐ (4) 大 ☐ (5) 極大
21. 種子形狀：☐ (1) 圓 ☐ (2) 扁圓 ☐ (3) 橢圓 ☒ (4) 扁橢圓
22. 種子色澤：☐ (1) 黃白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 淡褐 ☒ (6) 褐 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑 ☐ (9) 複色
23. 種臍色澤：☐ (1) 白 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 綠 ☒ (4) 淡褐 ☐ (5) 褐 ☐ (6) 暗褐 ☐ (7) 灰 ☐ (8) 黑
24. 子葉色澤：☐ (1) 黃 ☒ (2) 綠
25. 種皮光澤：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強
26. 種皮裂皮性：☐ (1) 易 ☒ (2) 中 ☐ (3) 難

七、其他

27. 倒伏抗性：☐ (1) 極弱 ☒ (2) 弱 ☐ (3) 中 ☐ (4) 強 ☐ (5) 極強
28. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
29. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱



05A01696

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☒ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



05A01717

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤：☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色：☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重：☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤：☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數：☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高：☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☒ (4) 圓卵形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色：☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色：☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☒ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色：☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色：☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數：☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數：☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量：☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型：☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀：



05A01729

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☐ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00680

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00688

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☒ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☒ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☒ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☒ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:
約在10月27日始花
最後採收日為翌年1月13日, 但此時仍有些豆莢未成熟。



06A00689

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☒ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 4~6 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他


1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00693

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☒ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☒ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00701

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00708

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☒ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00712

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☒ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☐ (1) 有限型 ☒ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00713

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤：☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色：☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重：☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤：☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數：☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高：☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☒ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色：☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色：☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色：☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色：☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數：☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數：☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量：☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性：☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型：☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀：



06A00714

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤：☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色：☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重：☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數：☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高：☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性：☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 圓卵形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色：☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色：☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色：☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色：☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數：☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數：☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量：☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性：☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型：☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀：



06A00715

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花



1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☐ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00724

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☒ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☐ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00725

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☒ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☒ (4) 卵圓形
3. 葉色: ☒ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00727

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00733

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤：☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色：☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
3. 千粒種子重：☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤：☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數：☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高：☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
3. 分枝性：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀：☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色：☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色：☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色：☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色：☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數：☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數：☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量：☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型：☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀：



06A00735

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00736

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☒ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☒ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00738

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☒ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00743

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00744

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1)粉質 ☒ (2)油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1)淺黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)暗黃 ☐ (4)淺綠 ☐ (5)綠
☐ (6)暗綠 ☒ (7)褐 ☐ (8)黑
3. 千粒種子重: ☒ (1)輕 ☐ (2)中 ☐ (3)重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1)少 ☐ (2)中 ☐ (3)多
2. 株高: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)
3. 分枝性: ☒ (1)弱 ☐ (2)中 ☐ (3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1)<1 ☐ (2)1~2 ☐ (3)2~3 ☒ (4)3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1)披針形 ☒ (2)長橢圓披針形 ☐ (3)菱形 ☐ (4)卵圓形
☐ (5)橢圓形
3. 葉色: ☐ (1)淺綠 ☒ (2)綠 ☐ (3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1)綠 ☐ (2)綠及紫 ☐ (3)紫綠 ☐ (4)紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1)淺黃 ☒ (2)黃 ☐ (3)黃綠 ☐ (4)綠 ☐ (5)其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1)黃 ☐ (2)黃綠 ☐ (3)其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1)基部 ☐ (2)中部 ☒ (3)頂部
2. 每株莢數: ☒ (1)少 ☐ (2)中 ☐ (3)多
3. 每莢種子數: ☒ (1)5以下 ☐ (2)6~8 ☐ (3)9~11 ☐ (4)12~14
☐ (5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1)灰黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)褐 ☒ (4)暗褐 ☐ (5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1)早 ☒ (2)中 ☐ (3)晚
6. 每株種子產量: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1)強 ☐ (2)中 ☐ (3)弱
2. 抗蟲性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
3. 株型: ☒ (1)有限型 ☐ (2)無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00745

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1)粉質 ☒ (2)油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1)淺黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)暗黃 ☐ (4)淺綠 ☐ (5)綠
☐ (6)暗綠 ☒ (7)黃褐 ☐ (8)黑
3. 千粒種子重: ☒ (1)輕 ☐ (2)中 ☐ (3)重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1)少 ☐ (2)中 ☐ (3)多
2. 株高: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)高
3. 分枝性: ☒ (1)弱 ☐ (2)中 ☐ (3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1)<1 ☐ (2)1~2 ☐ (3)2~3 ☒ (4)3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1)披針形 ☒ (2)長橢圓披針形 ☐ (3)菱形 ☐ (4)卵圓形
☐ (5)橢圓形
3. 葉色: ☐ (1)淺綠 ☒ (2)綠 ☐ (3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1)綠 ☒ (2)綠及紫 ☐ (3)紫綠 ☐ (4)紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1)淺黃 ☒ (2)黃 ☐ (3)黃綠 ☐ (4)綠 ☐ (5)其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1)黃 ☐ (2)黃綠 ☐ (3)其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1)基部 ☐ (2)中部 ☒ (3)頂部
2. 每株莢數: ☐ (1)少 ☒ (2)中 ☐ (3)多
3. 每莢種子數: ☒ (1)5以下 ☐ (2)6~8 ☐ (3)9~11 ☐ (4)12~14
☐ (5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1)灰黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)褐 ☒ (4)暗褐 ☐ (5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1)早 ☐ (2)中 ☒ (3)晚
6. 每株種子產量: ☐ (1)低 ☒ (2)中 ☐ (3)高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
2. 抗蟲性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
3. 株型: ☒ (1)有限型 ☐ (2)無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00746

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1)粉質 ☐ (2)油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1)淺黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)暗黃 ☐ (4)淺綠 ☐ (5)綠 ☐ (6)暗綠 ☒ (7)褐 ☐ (8)黑
3. 千粒種子重: ☒ (1)輕 ☐ (2)中 ☐ (3)重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1)少 ☐ (2)中 ☐ (3)多
2. 株高: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)高
3. 分枝性: ☐ (1)弱 ☒ (2)中 ☐ (3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1)<1 ☒ (2)1~2 ☐ (3)2~3 ☐ (4)3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1)披針形 ☒ (2)長橢圓披針形 ☐ (3)菱形 ☐ (4)卵圓形 ☐ (5)橢圓形
3. 葉色: ☐ (1)淺綠 ☒ (2)綠 ☐ (3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1)綠 ☐ (2)綠及紫 ☒ (3)紫綠 ☐ (4)紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1)淺黃 ☒ (2)黃 ☐ (3)黃綠 ☐ (4)綠 ☐ (5)其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1)黃 ☐ (2)黃綠 ☐ (3)其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1)基部 ☒ (2)中部 ☐ (3)頂部
2. 每株莢數: ☐ (1)少 ☐ (2)中 ☒ (3)多
3. 每莢種子數: ☐ (1)5以下 ☒ (2)6~8 ☐ (3)9~11 ☐ (4)12~14 ☐ (5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1)灰黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)褐 ☐ (4)暗褐 ☒ (5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1)早 ☐ (2)中 ☒ (3)晚
6. 每株種子產量: ☐ (1)低 ☐ (2)中 ☒ (3)高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
2. 抗蟲性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
3. 株型: ☒ (1)有限型 ☐ (2)無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00747

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☐ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☒ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☒ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☐ (1) 有限型 ☒ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00754

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1)粉質 ☒ (2)油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1)淺黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)暗黃 ☐ (4)淺綠 ☐ (5)綠 ☐ (6)暗綠 ☐ (7)褐 ☒ (8)黑
3. 千粒種子重: ☒ (1)輕 ☐ (2)中 ☐ (3)重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1)少 ☐ (2)中 ☐ (3)多
2. 株高: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)高
3. 分枝性: ☐ (1)弱 ☒ (2)中 ☐ (3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1)<1 ☒ (2)1~2 ☐ (3)2~3 ☐ (4)3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1)披針形 ☐ (2)長橢圓披針形 ☒ (3)菱形 ☐ (4)卵圓形 ☐ (5)橢圓形
3. 葉色: ☐ (1)淺綠 ☒ (2)綠 ☐ (3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1)綠 ☐ (2)綠及紫 ☐ (3)紫綠 ☐ (4)紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1)淺黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)黃綠 ☐ (4)綠 ☐ (5)其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1)黃 ☐ (2)黃綠 ☐ (3)其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1)基部 ☐ (2)中部 ☒ (3)頂部
2. 每株莢數: ☐ (1)少 ☐ (2)中 ☒ (3)多
3. 每莢種子數: ☐ (1)5以下 ☒ (2)6~8 ☐ (3)9~11 ☐ (4)12~14 ☐ (5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1)灰黃 ☐ (2)黃 ☒ (3)褐 ☐ (4)暗褐 ☐ (5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1)早 ☒ (2)中 ☐ (3)晚
6. 每株種子產量: ☐ (1)低 ☒ (2)中 ☐ (3)高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1)強 ☐ (2)中 ☒ (3)弱
2. 抗蟲性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
3. 株型: ☒ (1)有限型 ☐ (2)無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00763

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00773

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☒ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☒ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☒ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00774

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☒ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☒ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☒ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00801

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 暗褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高 (成熟期): ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☐ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00802

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤：☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色：☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重：☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤：☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數：☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高：☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
3. 分枝性：☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：☒ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀：☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色：☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色：☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色：☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色：☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數：☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數：☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤：☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量：☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性：☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性：☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
3. 株型：☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀：



06A00803

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00835



吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠 ☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☐ (1) 黃 ☒ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00836

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☒ (1) 早 ☐ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00843

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3)
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☐ (2) 綠 ☒ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00844

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☒ (5) 綠
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☒ (2) 中部 ☐ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00847

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☒ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形 ☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14 ☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☒ (1) 強 ☐ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00860

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☒ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☐ (2) 中 ☒ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☒ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☐ (2) 中 ☒ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☐ (1) 有限型 ☒ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00861

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☒ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☒ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☒ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☐ (2) 中 ☒ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高 (註明: 5株平均 公克)

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00870

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
 2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☒ (7) 褐 ☐ (8) 黑
 3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
 2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
 2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3)
 3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☒ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
 2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
 3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
 4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1) 淺黃 ☒ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
 2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
 2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
 3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
 4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☒ (3) 褐 ☐ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
 5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
 6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
 2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
 3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
 4. 其他需要補充之性狀:



06A00891

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☐ (1) 粉質 ☒ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☒ (5) 綠
☐ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☐ (1) 輕 ☒ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☒ (1) 弱 ☐ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☒ (1) <1 ☐ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☒ (2) 長橢圓披針形 ☐ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☐ (1) 少 ☒ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☐ (1) 5以下 ☒ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☐ (1) 低 ☒ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☐ (2) 中 ☒ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00897

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤：■(1)粉質 □(2)油亮
2. 種皮顏色：□(1)淺黃 □(2)黃 □(3)暗黃 □(4)淺綠 □(5)綠
■(6)暗綠 □(7)褐 □(8)黑
3. 千粒種子重：■(1)輕 □(2)中 □(3)重

二、子葉

1. 上胚軸色澤：■(1)綠 □(2)紫
2. 下胚軸色澤：□(1)綠 ■(2)紫

三、莖

1. 主莖節數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
2. 株高(成熟期)：■(1)低 □(2)中 □(3)
3. 分枝性：□(1)弱 ■(2)中 □(3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比：□(1)<1 ■(2)1~2 □(3)2~3 □(4)3~4
2. 小葉形狀：□(1)披針形 ■(2)長橢圓披針形 □(3)菱形 □(4)卵圓形
□(5)橢圓形
3. 葉色：□(1)淺綠 ■(2)綠 □(3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色：□(1)綠 ■(2)綠及紫 □(3)紫綠 □(4)紫

五、花

1. 花朵旗瓣顏色：■(1)淺黃 □(2)黃 □(3)黃綠 □(4)綠 □(5)其他
2. 花朵翼瓣顏色：□(1)黃 ■(2)黃綠 □(3)其他

六、莢果

1. 著莢位置：豆莢主要分佈於植冠之 □(1)基部 ■(2)中部 □(3)頂部
2. 每株莢數：■(1)少 □(2)中 □(3)多
3. 每莢種子數：□(1)5以下 ■(2)6~8 □(3)9~11 □(4)12~14
□(5)14粒以上(5莢平均)
4. 乾莢色澤：□(1)灰黃 □(2)黃 ■(3)褐 □(4)暗褐 □(5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數：■(1)早 □(2)中 □(3)晚
6. 每株種子產量：■(1)低 □(2)中 □(3)高

七、其他

1. 抗病性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
2. 抗蟲性：□(1)強 ■(2)中 □(3)弱
3. 株型：■(1)有限型 □(2)無限型
4. 其他需要補充之性狀：

- (1)開花結果期早。
- (2)生長期快速。



06A00898

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1) 粉質 ☐ (2) 油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 暗黃 ☐ (4) 淺綠 ☐ (5) 綠
☒ (6) 暗綠 ☐ (7) 褐 ☐ (8) 黑
3. 千粒種子重: ☒ (1) 輕 ☐ (2) 中 ☐ (3) 重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1) 綠 ☐ (2) 紫
2. 下胚軸色澤: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 紫

三、莖

1. 主莖節數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
2. 株高: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高
3. 分枝性: ☐ (1) 弱 ☒ (2) 中 ☐ (3) 強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1) <1 ☒ (2) 1~2 ☐ (3) 2~3 ☐ (4) 3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1) 披針形 ☐ (2) 長橢圓披針形 ☒ (3) 菱形 ☐ (4) 卵圓形
☐ (5) 橢圓形
3. 葉色: ☐ (1) 淺綠 ☒ (2) 綠 ☐ (3) 暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☐ (1) 綠 ☒ (2) 綠及紫 ☐ (3) 紫綠 ☐ (4) 紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☒ (1) 淺黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 黃綠 ☐ (4) 綠 ☐ (5) 其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1) 黃 ☐ (2) 黃綠 ☐ (3) 其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1) 基部 ☐ (2) 中部 ☒ (3) 頂部
2. 每株莢數: ☒ (1) 少 ☐ (2) 中 ☐ (3) 多
3. 每莢種子數: ☒ (1) 5以下 ☐ (2) 6~8 ☐ (3) 9~11 ☐ (4) 12~14
☐ (5) 14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1) 灰黃 ☐ (2) 黃 ☐ (3) 褐 ☒ (4) 暗褐 ☐ (5) 黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☐ (1) 早 ☒ (2) 中 ☐ (3) 晚
6. 每株種子產量: ☒ (1) 低 ☐ (2) 中 ☐ (3) 高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
2. 抗蟲性: ☐ (1) 強 ☒ (2) 中 ☐ (3) 弱
3. 株型: ☒ (1) 有限型 ☐ (2) 無限型
4. 其他需要補充之性狀:



06A00902

吉豆 (Black Gram)

品種特性



一、種子

1. 種皮光澤: ☒ (1)粉質 ☐ (2)油亮
2. 種皮顏色: ☐ (1)淺黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)暗黃 ☐ (4)淺綠 ☐ (5)綠
☒ (6)暗綠 ☐ (7)褐 ☐ (8)黑
3. 千粒種子重: ☐ (1)輕 ☐ (2)中 ☒ (3)重

二、子葉

1. 上胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫
2. 下胚軸色澤: ☒ (1)綠 ☐ (2)紫

三、莖

1. 主莖節數: ☐ (1)少 ☒ (2)中 ☐ (3)多
2. 株高: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)
3. 分枝性: ☐ (1)弱 ☒ (2)中 ☐ (3)強

四、葉片

1. 初生葉長寬比: ☐ (1)<1 ☒ (2)1~2 ☐ (3)2~3 ☐ (4)3~4
2. 小葉形狀: ☐ (1)披針形 ☒ (2)長橢圓披針形 ☐ (3)菱形 ☐ (4)卵圓形
☐ (5)橢圓形
3. 葉色: ☐ (1)淺綠 ☒ (2)綠 ☐ (3)暗綠
4. 葉柄基部之顏色: ☒ (1)綠 ☐ (2)綠及紫 ☐ (3)紫綠 ☐ (4)紫

五、花


1. 花朵旗瓣顏色: ☐ (1)淺黃 ☒ (2)黃 ☐ (3)黃綠 ☐ (4)綠 ☐ (5)其他
2. 花朵翼瓣顏色: ☒ (1)黃 ☐ (2)黃綠 ☐ (3)其他

六、莢果

1. 著莢位置: 豆莢主要分佈於植冠之 ☐ (1)基部 ☒ (2)中部 ☐ (3)頂部
2. 每株莢數: ☒ (1)少 ☐ (2)中 ☐ (3)多
3. 每莢種子數: ☒ (1)5以下 ☐ (2)6~8 ☐ (3)9~11 ☐ (4)12~14
☐ (5)14粒以上 (5莢平均)
4. 乾莢色澤: ☐ (1)灰黃 ☐ (2)黃 ☐ (3)褐 ☒ (4)暗褐 ☐ (5)黑
5. 播種至50%豆莢成熟日數: ☒ (1)早 ☐ (2)中 ☐ (3)晚
6. 每株種子產量: ☒ (1)低 ☐ (2)中 ☐ (3)高

七、其他

1. 抗病性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
2. 抗蟲性: ☐ (1)強 ☒ (2)中 ☐ (3)弱
3. 株型: ☒ (1)有限型 ☐ (2)無限型
4. 其他需要補充之性狀:



農業試驗所作物種原組中期庫 吉豆與爪哇大豆種子發芽率

吉豆

作物別	暫時碼	播種試驗平均發芽率(%)
吉豆(BLACK GRAM)	05A01696	100
吉豆(BLACK GRAM)	05A01717	100
吉豆(BLACK GRAM)	05A01729	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00680	95.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00688	87.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00689	70
吉豆(BLACK GRAM)	06A00693	77.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00701	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00708	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00712	94.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00713	64.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00714	82.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00715	88
吉豆(BLACK GRAM)	06A00724	80
吉豆(BLACK GRAM)	06A00725	64
吉豆(BLACK GRAM)	06A00727	62
吉豆(BLACK GRAM)	06A00733	44
吉豆(BLACK GRAM)	06A00735	87
吉豆(BLACK GRAM)	06A00736	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00738	77.7
吉豆(BLACK GRAM)	06A00743	75.3
吉豆(BLACK GRAM)	06A00744	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00745	87.5
吉豆(BLACK GRAM)	06A00746	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00747	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00754	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00763	96
吉豆(BLACK GRAM)	06A00773	88
吉豆(BLACK GRAM)	06A00774	71
吉豆(BLACK GRAM)	06A00801	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00802	90
吉豆(BLACK GRAM)	06A00803	90
吉豆(BLACK GRAM)	06A00835	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00836	100
吉豆(BLACK GRAM)	06A00843	98
吉豆(BLACK GRAM)	06A00844	82
吉豆(BLACK GRAM)	06A00847	95
吉豆(BLACK GRAM)	06A00860	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00861	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00870	64
吉豆(BLACK GRAM)	06A00891	30
吉豆(BLACK GRAM)	06A00897	40
吉豆(BLACK GRAM)	06A00898	93
吉豆(BLACK GRAM)	06A00902	100

農業試驗所作物種原組中期庫 吉豆與爪哇大豆種子發芽率

爪哇大豆

作物別	暫時碼	播種試驗平均發芽率(%)
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05215	26.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05216	29
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05217	50.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05218	47.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05219	57.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05220	41.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05221	14.2
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05222	8.3
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05223	31.3
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05224	52.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05225	75
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05226	10.6
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05227	32.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05228	43
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05229	45.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05230	46.9
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05231	57
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05232	50
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05233	65.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05234	9.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	00A05235	45
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00121	28.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00122	43.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00123	18
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00124	28.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00125	23.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00126	52.5
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00127	5.2
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00128	11.1
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00129	20
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00130	23.7
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00131	46
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00132	43
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00133	25.2
爪哇大豆(RHODESIAN KUDZU)	99A00134	33.5

吉豆性狀調查表填表說明 (參考綠豆品種性狀檢定表修訂)

吉豆

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義		備考
1	千粒種子重	果莢成熟期測定	輕 中 重	少於或等於35克 35.1克至45克 多於或等於45.1克	
2	主莖節數	成熟期測定	少 中 多	低於或等於4.8節 4.9節至5.8節 高於或等於5.9節	五株 平均
3	主莖高度	成熟期測定	低 中 高	低於或等於23公分 23.1公分至30公分 高於或等於30.1公分	五株 平均
4	分枝數	成熟期測定	弱 中 強	少於或等於3.6支 3.7支至5.8支 多於或等於5.9支	五株 平均
5	每株莢數	成熟期測定	少 中 多	少於或等於5莢 5.1莢至9莢 多於或等於9.1莢	五株 平均
6	播種至50% 豆莢成熟日數	成熟期測定	早 中 晚	少於或等於59天 60天至79天 多於或等於80天	五株 平均
7	每株種子產量	成熟期測定	低 中 高	少於或等於1.2克 1.3克至2克 多於或等於2.1克	五株 平均

爪哇大豆性狀調查表填表說明 (參照大豆品種性狀檢定表)

爪哇大豆

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義	備考
1 (*) (+)	株型	60或89觀察	參照圖1	
2 (*) (+)	下胚軸色澤	10觀察	參照圖2	
3 (*) (+)	主莖茸毛色澤	65開花期觀察	參照圖3	
4 (*) (+)	主莖茸毛多少	65開花期觀察	參照圖4	
5 (*) (+)	主莖茸毛形狀	65開花期觀察	參照圖5	
6 (*)	主莖高度	79綠莢成熟期或 89成熟期測定	1 低於或等於30公分 2 30.1公分至40公分 3 40.1公分至50公分 4 50.1公分至60公分 5 60.1公分至70公分 6 70.1公分至80公分 7 80.1公分至90公分 8 90.1公分至100公分 9 高於100公分	
7	分枝數	79綠莢成熟期或 89成熟期測定	1 少於或等於3.0支 3 3.1支至4.0支 5 4.1支至5.0支 7 5.1支至6.0支 9 多於6.0支	
8	主莖節數	79綠莢成熟期或 89成熟期測定	1 少於或等於9.0節 3 9.1節至13.0節 5 13.1節至17.0節 7 17.1節至21.0節 9 多於21.0節	

爪哇大豆性狀調查表填表說明 (參照大豆品種性狀檢定表)

爪哇大豆

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
9	結莢高度	79綠莢成熟期或 89成熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於12.0公分 12.1公分至14.0公分 14.1公分至16.0公分 16.1公分至18.0公分 高於18.0公分	
10	小葉數	65開花期觀察	參照圖6			
11	小葉形狀	65開花期觀察	參照圖7			
12	開花期	65開花期觀察	極早 早 中 晚 極晚	1 3 5 7 9	少於或等於25天 26天至32天 33天至39天 40天至45天 多於45天	
13	花色	65開花期觀察	參照圖8			
14	綠莢成熟期	79綠莢成熟期測定	極早 早 中 晚 極晚	1 3 5 7 9	少於或等於70天 71天至80天 81天至90天 91天至100天 多於100天	毛豆用
15	鮮莢色澤	79綠莢成熟期觀察	參照圖9			毛豆用
16	單株總莢數	79綠莢成熟期測定	極少 少 中 多 極多	1 3 5 7 9	少於或等於20.0莢 20.1莢至30.0莢 30.1莢至40.0莢 40.1莢至50.0莢 多於50.0莢	毛豆用
17	單株總莢重	79綠莢成熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於40.0公克 40.1公克至60.0公克 60.1公克至80.0公克 80.1公克至100.0公克 高於100.0公克	毛豆用
18	著莢密度	79綠莢成熟期 測定單株總莢數 / 主莖長度	極疏 疏 中 密 極密	1 3 5 7 9	低於或等於0.75 0.75至1.00 1.01至1.25 1.26至1.50 高於1.50	毛豆用

爪哇大豆性狀調查表填表說明 (參照大豆品種性狀檢定表)

爪哇大豆

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義					備考
19 (*)	合格莢大小	79綠莢成熟期 測定二粒莢以上 之百莢重	極小 小 中 大 極大	1 3 5 7 9	少於或等於295公克 296公克至325公克 326公克至355公克 356公克至385公克 高於385公克			毛豆用
20	合格莢率	79綠莢成熟期 測定單株合格莢 重 / 單株總莢重	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於60.0% 60.1%至70.0% 70.1%至80.0% 80.1%至90.0% 高於90.0%			毛豆用
21 (*)	≥三粒莢率	79綠莢成熟期 測定三粒莢以上 莢數 / 單株總莢數	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於10.0% 10.1%至20.0% 20.1%至30.0% 30.1%至40.0% 高於40.0%			毛豆用
22 (*)	二粒莢長	79綠莢成熟期測定	極短 短 中 長 極長	1 3 5 7 9	小於或等於4.0公分 4.1公分至4.5公分 4.6公分至5.0公分 5.1公分至5.5公分 大於5.5公分			毛豆用
23 (*)	二粒莢寬	79綠莢成熟期測定	極狹 狹 中 廣 極廣	1 3 5 7 9	小於或等於1.0公分 1.01公分至1.20公分 1.21公分至1.40公分 1.41公分至1.60公分 大於1.60公分			毛豆用
24	單莢粒數 (單株粒數 / 單株莢數)	79綠莢成熟期測定	極少 少 中 多 極多	1 3 5 7 9	少於或等於1.50粒 1.51粒至1.80粒 1.81粒至2.10粒 2.11粒至2.40粒 多於2.40粒			毛豆用
25 (*)	剝實率 (單株粒重 / 單株莢重)	79綠莢成熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於50.0% 50.1%至60.0% 60.1 ~ 70.0% 70.1 ~ 80.0% 高於80.0%			毛豆用
26 (*)	鮮籽粒大小	79綠莢成熟期 測定飽滿鮮豆仁之 百粒重	極小 小 中 大 極大	1 3 5 7 9	少於或等於70公克 71公克至80公克 81公克至90公克 91公克至100公克 高於100公克			毛豆用

爪哇大豆性狀調查表填表說明 (參照大豆品種性狀檢定表)

爪哇大豆

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
27 (*) (+)	鮮籽粒色澤	79綠莢成熟期觀察	參照圖10			毛豆用
28 (+)	殺菁後鮮豆 莢色澤	79綠莢成熟期觀察	參照圖11			毛豆用
29	殺菁後鮮籽 粒香氣	79綠莢成熟期測定	官能品評			毛豆用
30	殺菁後鮮籽 粒甜味	79綠莢成熟期測定	官能品評			毛豆用
31 (*)	乾莢成熟期	89成熟期測定	極早 早 中 晚 極晚	1 3 5 7 9	少於或等於90天 91天至105天 106天至120天 121天至135天 多於135天	
32 (*) (+)	乾莢色澤	89成熟期觀察	參照圖12			
33 (+)	裂莢性	89成熟期觀察	參照圖13			
34 (*)	種子大小	99枯熟期測定種 子的百粒重	極小 小 中 大 極大	1 2 3 4 5 6 7 8 9	少於或等於10.0公克 10.1公克至15.0公克 15.1公克至20.0公克 20.1公克至25.0公克 25.1公克至30.0公克 30.1公克至35.0公克 35.1公克至40.0公克 40.1公克至50.0公克 高於50.0公克	
35 (*)	種子形狀	99枯熟期測定種子 長、寬、厚	圓 扁圓 橢圓 扁橢圓	1 2 3 4	寬/長；厚/寬 大於或等於0.85；大於或 等於0.85 大於或等於0.85；小於0.85 小於0.85；大於或等於0.85 小於0.85；小於0.85	
36 (*) (+)	種子色澤	99枯熟期觀察	參照圖14			
37 (*) (+)	種臍色澤	99枯熟期觀察	參照圖15			

爪哇大豆性狀調查表填表說明 (參照大豆品種性狀檢定表)

爪哇大豆

性狀	調查性狀	調查時期及方法	定義			備考
38 (*) (+)	子葉色澤	99枯熟期觀察	參照圖16			
39 (+)	種子光澤	99枯熟期觀察	參照圖17			
40 (+)	種皮裂皮性	99枯熟期觀察	參照圖18			
41	粗蛋白含有率	99枯熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於36.0% 36.1%至40.0% 40.1%至44.0% 44.1%至48.0% 高於48.0%	
42	粗脂肪含有率	99枯熟期測定	極低 低 中 高 極高	1 3 5 7 9	低於或等於15.0% 15.1%至19.0% 19.1%至22.0% 22.1%至26.0% 高於26.0%	
43	適栽期	79綠莢成熟期或 89成熟期觀察	指檢定地區的最適播種期。			
44	倒伏抗性	79綠莢成熟期或 89成熟期觀察主 莖傾斜角度	極弱 弱 中 強 極強	1 3 5 7 9	大於60度 41度至60度 21度至40度 11度至20度 小於或等於10度	

註：“*”表示性狀檢定必須調查之項目。

“+”表示此性狀有圖示。

“x”調查時期參照表1。

圖1 株型 (性狀1)



有限生長型



半無限生長型



無限生長型

圖2 幼莖胚軸色澤 (性狀2)



綠色



紫色

圖3 植株茸毛色澤 (性狀3)



無



白色



褐色

圖4 植株茸毛多少 (性狀4)



無

疏

密

圖5 植株茸毛形狀 (性狀5)



無

直

扁

圖6 小葉數目 (性狀10)



3葉

5葉

7葉

圖7 小葉形狀 (性狀11)



1.披針形
lanceolate

2.菱形
diamond

3.銳卵形
pointed ovate

4.卵圓形
rounded ovate

圖8 花色 (性狀13)



白色

紫色

圖9 鮮莢色澤 (性狀15)



淡綠

綠

濃綠

圖10 鮮籽粒色澤 (性狀27)



淡綠

綠

濃綠

紫綠

圖11 殺菁後鮮莢色澤 (性狀28)



淡綠

綠

濃綠

圖12 乾莢色澤 (性狀32)



淡褐

褐

暗褐

圖13 裂莢性 (性狀33)




易



難

圖14 種子色澤 (性狀36)




黃白

黃

黃綠

綠



淡褐

褐


暗褐

黑



雜色

圖15 種臍色澤 (性狀37)



黃

綠




淡褐



褐



暗褐



黑



黑



灰

圖16 子葉色澤 (性狀38)



黃




綠

圖17 種皮光澤 (性狀39)



圖18 裂皮性 (性狀40)





吉豆與爪哇大豆種原圖說

Black Gram and Rhodesian Kudzu Germplasm Illustrations

編著者:蕭翌柱 Yih-Juh Shiau、黃倉海 Chang-Hai Huang

發行人:陳駿季 Junne-Jih Chen

出版者:行政院農業委員會農業試驗所

Taiwan Agricultural Research Institute, Council of Agriculture, Executive Yuan

地址:台中市霧峰區萬豐里中正路189號

No.189,Zhongzheng Rd.,Wufeng Dist.,Taichung City 41362,Taiwan(R.O.C.)

電話:(04)2330-2301

傳真:(04)2333-8162

網址:<http://www.tari.gov.tw>

出版年月:2016年12月

定價:200元

系統號:4510-5030-48

ISBN:9789-8605-1515-2

展售處:GPK政府出版品知識庫<http://www.govbooks.com.tw/GPK>

電子書設機製作

設計製作:峰林實業有限公司

地址:臺中市西屯區長安路二段101號

電話:(04)22967677

電子郵件:Ching.kai@msa.hinet.net

電子書播放資訊

作業系統:Windows,Mac

檔案格式:Adobe PDF

檔案內容:2D

播放軟體:PDF Reader

使用載具:PC